



مقایسه اضطراب و افسردگی در گروه‌های چهارگانه بیماری مولتیپل اسکلروزیس

نسترن مجددی نسب^۱، پرینا گنجه^۲، ساناز خرمزاده^۲، رحیم ربیعی نژاد^۲، هانی رحیمی^۲

۱- دانشیار بیماری‌های مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

۲- کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مقدمه: در تظاهرات و سیر بیماری MS از شخصی به شخص دیگر متفاوت است اما بطور کلی بر اساس الگوی بروز و تناوب علائم، بیماری MS به چهار گروه پیشرونده و فروکش یابنده، پیشرونده اولیه، پیشرونده ثانویه و پیشرونده-عود کننده طبقه‌بندی می‌شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه اضطراب و افسردگی در این چهار گروه بیماری MS می‌باشد.

نمونه روش: پژوهش شامل ۳۰۰ نفر از بیماران MS عضو انجمن MS شهر اهواز بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از سیاهه اضطراب و افسردگی بک به عنوان ابزار استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون واریانس یکراهه انجام شد.

نتایج: نشان داد که در هر سه متغیر پژوهش، بین چهار گروه تفاوت معنی‌دار وجود دارد. در هر دو متغیر اضطراب و افسردگی، بیماران مبتلا به نوع پیشرونده اولیه مولتیپل اسکلروزیس نمره بیشتری کسب کردند. با توجه به نتایج یافته‌های پژوهش حاضر مبنی بر اضطراب و افسردگی بیشتر در نوع پیشرونده اولیه، به نظر می‌رسد باید به این گروه از بیماران MS توجه بیشتری صورت گیرد.

واژه‌های کلیدی: اضطراب، افسردگی، مولتیپل اسکلروزیس

Archive