

## مطالعه خاصیت ضد میکروبی و ترکیب شیمیایی اسانس لعل کوهستان (*Oliveria decumbens* Vent.)

محدثه محبوبی<sup>۱\*</sup>، محمدمهدی فیض‌آبادی<sup>۲</sup>، قاسم حقی<sup>۳</sup> و حسین حسینی<sup>۴</sup>

۱- کارشناس ارشد میکروب شناسی، بخش میکروب شناسی شرکت داروسازی باریج اسانس، کاشان، پست الکترونیک: mahboubi@Barijessence.com

۲- دانشیار میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳- کارشناس ارشد شیمی، بخش فیتوشیمی و تجزیه دستگاهی، شرکت داروسازی باریج اسانس، کاشان

۴- کارشناس کشاورزی، بخش تحقیقات کشاورزی شرکت داروسازی باریج اسانس، کاشان

\* نویسنده مسئول مقاله

تاریخ پذیرش: دی ۱۳۸۶

تاریخ اصلاح نهایی: آذر ۱۳۸۶

تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۸۶

### چکیده

گیاه لعل کوهستان (*Oliveria decumbens* Vent.)، گیاهی است بوته‌ای از خانواده چتریان (Umbelliferae) که معمولاً در مناطق جنوبی ایران یافت می‌شود. مردم این منطقه به‌طور گسترده‌ای از قسمتهای هوایی این گیاه در درمان بیماریهای عفونی استفاده می‌کنند. هدف از این مطالعه، ارزیابی خاصیت ضد میکروبی اسانس حاصل از اندام هوایی این گیاه بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها شامل باکتریهای گرم منفی و مثبت، قارچهای رشته‌ای و مخمرها با استفاده از روشهای دیسک دیفیوژن و میکروبراث دایلوژن در شرایط آزمایشگاه بوده است. شناسایی اجزای اصلی موجود در اسانس به‌وسیله دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) انجام شد. ترکیبهای شناسایی شده در اسانس شامل تیمول (۲۶/۹٪)، کارواکرول (۰/۲۵٪)، پاراسیمن (۱۳/۳٪) و گاما-ترپنین (۱/۱٪) بود. اسانس حاصل از اندام هوایی با میانگین قطر هاله عدم رشد ۳۴/۸۶ میلی‌متر و MIC کوچکتر از ۰/۲۵ μl ml<sup>-1</sup> اثر ضد قارچی خوبی در مقابل قارچهای رشته‌ای و مخمر نشان داد. اثر ۲ میکرولیتر از اسانس بر قارچها با قطر هاله عدم رشد بزرگتر از ۲۷/۳ میلی‌متر از اثر آمفوتریسین B با قطر هاله عدم رشد کوچکتر از ۱۷ میلی‌متر بیشتر بود. باکتریهای گرم مثبت نسبت به باکتریهای گرم منفی در مقابل اسانس لعل کوهستان حساس‌تر بودند (۲۱/۹ در برابر ۱۸/۴ میلی‌متر). باکتریهای تشکیل‌دهنده اسپور (جنس باسیلوس) نسبت به اسانس مقاوم بوده و اسانس لعل کوهستان در مقابل باسیلوس‌ها دارای اثر مهاری بود. پسودوموناس آئروجینوزا با قطر هاله عدم رشد کمتر از ۸ میلی‌متر از سایر میکروارگانیسم‌ها نسبت به اسانس مقاوم‌تر بود. میکروارگانیسم‌ها از نظر مقاومت نسبت به اسانس گیاهی متفاوت بوده و باکتریها (گرم مثبت و منفی) نسبت به قارچها و باکتریهای گرم منفی نسبت به باکتریهای گرم مثبت مقاوم‌تر بودند. این اثر به ترکیبهای فنلی اسانس، به‌ویژه تیمول آن مربوط می‌شود. مطالعات بیشتری لازم است تا کارایی این اسانس به‌عنوان یک عامل ضد میکروبی ارزیابی گردد.

واژه‌های کلیدی: فعالیت ضد میکروبی، لعل کوهستان (*Oliveria decumbens* Vent.)، باکتری، قارچ، مخمر، تیمول.

## مقدمه

استفاده از گیاه در درمان بیماریها به ویژه بیماریهای عفونی در سالهای اخیر روند رو به افزونی پیدا کرده است. استفاده بی‌رویه از داروهای شیمیایی جهت درمان بیماریهای عفونی منجر به ظهور ایزوله‌های مقاوم میکروبی گردیده که هر روزه بر تعداد آنها افزوده می‌گردد (Dupont et al., 1996; Ayliffe et al., 1997). ظهور سویه‌های مقاوم به داروهای شیمیایی، تلاش برای یافتن عوامل ضد میکروبی جدید را ضروری می‌نماید. گیاهان و ترکیبهای آنها شامل اسانسها و عصاره‌های گیاهی دارای توان بالقوه جهت جایگزینی با داروهای شیمیایی هستند (Srinivasan et al., 2001). این در حالی است که عوارض جانبی این ترکیبها در مقایسه با داروهای شیمیایی کمتر است (Cowan, 1999). استفاده از اسانسهای گیاهی در صنایع دارویی، مواد غذایی، طب مکمل و درمانهای گیاهی براساس خاصیت ضد میکروبی اسانسهای گیاهی در مقابل ارگانسیم‌های مختلف استوار است (Nascimento et al., 2000; Rana et al., 1997).

از جمله گیاهان بومی ایران، می‌توان از گیاه لعل کوهستان نام برد. جنس *Oliveria* متعلق به خانواده Umbelliferae در ایران یک گونه با نام *O. decumbens* دارد که به‌طور محلی به آن "دن" یا "دنک" یا "موشکورک" می‌گویند و در مناطق گرمسیری استانهای کرمانشاه، خوزستان و ایلام می‌روید و علاوه بر ایران در جنوب شرق آناتولی، سوریه و عراق نیز پراکنده است (مظفریان، ۱۳۸۲). در طب سنتی ایران از این گیاه جهت درمان سوء هاضمه، اسهال و دردهای شکمی و رفع تب استفاده می‌شود. مطالعات مختلفی روی ترکیب شیمیایی اسانس حاصل از گل‌های گیاه انجام گرفته است

(Sajadi & Hosseini, 2002)؛ نجف‌پور نوایی و میرزا، (۱۳۸۱؛ Amin et al., 2005) و تاکنون تنها یک مطالعه روی خاصیت ضد میکروبی آن انجام شده است (Amin et al., 2005). در آن مطالعه، بازده اسانس استخراج شده از گل‌های جمع‌آوری شده از جنوب شیراز ۶٪ گزارش شده است. این اسانس دارای ۴۷٪ تیمول، ۲۳٪ کارواکرول، ۸/۷٪ پاراسیمن و ۱۸٪ گاما-تریپنین بوده و اثرهای ضد میکروبی اسانس حاصل از گل‌های گیاه لعل کوهستان در مقابل تعداد محدودی میکروارگانسیم (۳ باکتری گرم مثبت، ۳ باکتری گرم منفی، ۱ قارچ رشته‌ای و یک مخمر) بررسی شده است. Amin و همکاران (۲۰۰۵) گزارش نموده‌اند که اسانس، فعالیت ضد میکروبی وسیعی در مقابل همه ارگانسیم‌های مطالعه شده نشان می‌دهد و این اثر با اثر آنتی‌بیوتیکهای تجاری قابل مقایسه می‌باشد. همچنین حداقل غلظت مهارکننده رشد (MIC) اسانس حاصل از گل‌های گیاه بر باکتریهای گرم مثبت و منفی نشان می‌دهد که میزان حساسیت باکتریهای گرم مثبت و منفی به یک اندازه می‌باشد و این مقدار از حداقل غلظت مهار کننده رشد برای قارچ و مخمر مطالعه شده در آن تحقیق کوچکتر است. این بدین معنی است که باکتریها در مقایسه با قارچها نسبت به اسانس حساس‌ترند. همچنین قطر هاله عدم رشد برای باکتریهای گرم مثبت و قارچها یکسان می‌باشد. بازده اسانس استخراج شده از گل‌های گیاه لعل کوهستان از منطقه کرمانشاه حدود ۱/۰٪ بوده است که دارای ۲۸٪ تیمول، ۲۹٪ کارواکرول، ۱۵/۴٪ پاراسیمن، ۲۰/۵٪ گاما-تریپنین می‌باشد (نجف‌پور نوایی و میرزا، ۱۳۸۱). تحقیق دیگری که روی اسانس لعل کوهستان انجام شده نشان داده که اسانس حاصل از گل‌های گیاه دارای ۳۷/۲٪ تیمول، ۲۲/۱٪ کارواکرول، ۱۱/۸٪ پاراسیمن

بود. برنامه‌ریزی حرارتی عبارت بود از  $230^{\circ}\text{C}$ – $50^{\circ}\text{C}$  با افزایش دمای  $3^{\circ}\text{C}$  در دقیقه، درجه حرارت محفظه تزریق  $117^{\circ}\text{C}$  در دمای ترانسفرلاین  $250^{\circ}\text{C}$  تعیین شد. سپس  $1\ \mu\text{l}$  از اسانس لعل کوهستان به دستگاه تزریق شد و درصد نسبی اجزای اصلی اسانس با استفاده از مواد استاندارد و مقایسه زمان بازداری شناسایی شد.

#### میکروارگانسیم‌های مورد مطالعه

از بین باکتریهای گرم مثبت *Bacillus subtilis* ATCC6051، *Bacillus cereus* ATCC1247، *Staphylococcus monocytogenes* ATCC7644، *Staphylococcus epidermidis aureus* ATCC25923، *Staphylococcus saprophyticus* ATCC 12228 و *Shigella* ATCC13518 و از بین باکتریهای گرم منفی *Escherichia coli flexeneri* (Clinical isolate) ATCC8739، *Salmonella typhimorium*، *Klebsiella pneumoniae* ATCC10031، ATCC14028، *Shigella Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027، *Proteus vulgaris* RI 231 *dysantri* PTCC118، *Enterobacter aeruginosa* و *Vibrio cholera* Inaba ATCC10006 (field قارچ و *Aspergillus flavus* isolate) و *Aspergillus niger* ATCC 16404 و مخمر *Candida albicans* ATCC 10231 انتخاب گردید.

#### تعیین خاصیت ضد میکروبی اسانس با استفاده از روش دیسک دیفیوژن

سویه‌های باکتریایی روی نوترینت آگار و سویه‌های قارچ و مخمر روی سابورودکستروز آگار در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  رشد داده شدند. ۲–۳ کلنی از کشت شبانه هر سویه میکروبی به سرم فیزیولوژی استریل افزوده شده و

و ۱۲/۸٪ گاما-تریپنین است (Sajadi & Hosseini, 2002). باتوجه به مطالعات فوق، ترکیبهای شیمیایی و اثر ضد میکروبی اسانس حاصل از اندام هوایی گیاه لعل کوهستان بر ۱۸ میکروارگانسیم مختلف بررسی گردید و نتایج بدست آمده با مطالعات گذشته مقایسه گردید.

#### مواد و روشها

##### شناسایی و جمع‌آوری گیاه

اندامهای هوایی گیاه لعل کوهستان (در مرحله کامل گلدهی) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ از منطقه کازرون در استان فارس جمع‌آوری گردید. پس از خشک کردن گیاه در سایه و خرد کردن آن به قطعات کوچک، از اندام هوایی گیاه به روش تقطیر با آب به مدت ۶ ساعت با دستگاه کلونجر (Clevenger apparatus) اسانس‌گیری به‌عمل آمد و پس از جداسازی اسانس از سطح آب، توسط سولفات سدیم آب‌گیری و در شیشه‌های تیره و در بسته نگهداری شد. مقدار  $3/4$  میلی لیتر اسانس به ازای  $100$  گرم وزن خشک گیاه حاصل شد ( $3/4\text{V/W}\%$ ).

##### تجزیه اسانس لعل کوهستان

نظر به این که در مراجع (Sajadi & Hosseini, 2002؛ نجف‌پور نوایی و میرزا ۱۳۸۱؛ Amin et al., 2005) اجزاء اسانس این گیاه بوسیله GC/MS شناسایی شده بود، در این تحقیق، اجزای عمده اسانس با استفاده از GC جداسازی و با روش نرمالیزاسیون، درصد آنها مشخص گردید. آنالیز اسانس با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف، الگوی Varian CP-3800 طبق شرایط زیر انجام شد. ستون مورد استفاده CP Sil 8CB به طول ۶۰ متر و قطر  $0/32$  میلی‌متر، ضخامت لایه فاز ساکن  $0/25$  میکرومتر، گاز حامل نیتروژن و فشار گاز سر ستون  $7\ \text{psi}$

حداقل غلظت مهارکننده رشد تعیین گردید. سپس  $10 \mu\text{l}$  از رقت MIC و چند رقت بالاتر از آن روی محیط کشت منتقل شده و اولین رقت که در آن رشدی مشاهده نشد به عنوان MBC یا حداقل غلظت کشنده رشد تعیین گردید.

### نتایج

اسانس حاصل از اندام هوایی گیاه لعل کوهستان به رنگ زرد و دارای بویی نافذ شبیه به بوی اسانس آویشن بود. بازده اسانس حاصل از اندام هوایی گیاه  $3/4\%$  بدست آمد. نظر به اینکه در مراجع اجزای اسانس به وسیله GC/MS شناسایی شده بودند، اجزای اسانس به وسیله جداسازی و به روش نرمالیزاسیون درصد آنها مشخص شد. اجزای غالب آن تیمول  $26/9\%$ ، پاراسیمن  $13/3\%$  و گاما ترپینن  $11\%$  تعیین گردید. میزان کارواکرول موجود در اسانس نیز  $0/25\%$  بود. اثر اسانس بر میکروارگانیسم‌های مختلف نشان داد که اسانس لعل کوهستان بر باکتریهای گرم مثبت، منفی، قارچها و مخمر مؤثر است اما میزان اثربخشی آن بسته به نوع ارگانیسم متفاوت است (جدولهای ۳-۱). براساس روش دیسک دیفیوژن قارچها در مقایسه با سایر میکروارگانیسم‌ها، نسبت به اسانس لعل کوهستان حساس تر می‌باشند (قطر هاله عدم رشد  $27/3-45/3$  میلی‌متر). مخمر کاندیدا آلبیکانس با قطر هاله عدم رشدی معادل  $32$  میلی‌متر، نظیر باکتریهای گرم مثبت ( $30/6-13$  میلی‌متر) نسبت به این اسانس حساسیت نشان می‌دهد. با توجه به میانگین اثر اسانس لعل کوهستان بر میکروارگانیسم‌های مختلف، قارچهای رشته‌ای و مخمر کاندیدا آلبیکانس در مقایسه با باکتریهای گرم مثبت در درجه اول قرار دارند ( $34/86$  در مقابل  $21/9$  میلی‌متر) (جدولهای ۱ و ۳). قارچ

کدورت آنها با  $0/5$  مک فارلند تنظیم گردید. سوسپانسیون باکتریایی (معادل  $1 \times 10^8 \text{ CFU ml}^{-1}$ ) آماده بر روی مولر هیتون آگار و سوسپانسیون قارچی ( $10^6 \text{ CFU ml}^{-1}$ ) روی سابورودکستروز آگار تلقیح گردیده سپس دیسکهای کاغذی استریل (قطر  $6$  میلی‌متر) حاوی  $2 \mu\text{l}$  اسانس که در  $20$  میکرولیتر DMSO (dimethylsulfoxide) حل شده است بر روی محیطهای کشت شده قرار داده شد. دیسک حاوی DMSO و دیسک آنتی‌بیوتیکی به عنوان کنترل روی کشت قرار داده شد (Mahboobi *et al.*, 2006). کشت‌های باکتریایی و قارچی به ترتیب  $24$  و  $48$  ساعت در دمای  $37^\circ\text{C}$  انکوبه گردیدند. سپس قطر هاله عدم رشد (بر اساس میلی‌متر) اندازه‌گیری گردید.

### تعیین حداقل غلظت مهار کننده رشد با استفاده از روش میکروبراث دایلوژن


در این روش سری دو برابر رقت از اسانس لعل کوهستان در  $10\%$  DMSO با غلظت  $2-20 \mu\text{l ml}^{-1}$  تهیه شد (NCCLS, 2006). سپس  $100 \mu\text{l}$  از هر رقت به هر چاهک از پلیت  $96$  تایی افزوده شد. استاندارد تهیه شده (معادل با  $0/5$  مک فارلند) در مرحله قبل رقیق گردید، به نحوی که غلظت سوسپانسیون میکروبی برای باکتریها  $10^6 \text{ CFU ml}^{-1}$  و برای قارچها  $10^4 \text{ CFU ml}^{-1}$  تنظیم گردید و در مورد باکتریها از محیط مولر هیتون براث و در قارچها و مخمرها از محیط RPMI 1640 که pH آن با مورفولین پروپان سولفونیلک اسید (MOPS)  $0/165$  مولار به  $7/2$  رسیده استفاده گردید و  $100 \mu\text{l}$  از سوسپانسیون میکروبی به هر چاهک افزوده شد و پلیتها در دمای  $37$  به مدت  $24$  ساعت برای باکتریها و به مدت  $48$  ساعت برای قارچها انکوبه گردیدند. اولین چاهک که در آن هیچ رشدی مشاهده نمی‌شود به عنوان MIC یا

ولگاریس (۲۸/۶) نسبت به سایر باکتریهای گرم منفی حساس تر می باشند. (جدول ۲) استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس از سایر استافیلوکوکها (براساس حداقل غلظت مهار کننده رشد (MIC) و باسیلوس سرئوس از باسیلوس سوبتیلیس حساس تر می باشد (قطر هاله عدم رشد بزرگتر و MIC کوچکتر). MBC باسیلوسها نسبت به سایر باکتریهای مورد مطالعه بزرگتر است ( $MBC > 2 \mu l$   $ml^{-1}$ ) (جدول شماره ۱). در بین باکتریهای گرم منفی بجز پسودوموناس آئروجینوزا و ویبریوکلا حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی رشد برابر است و نشان می دهد که اسانس لعل کوهستان دارای اثر باکتری کشی است.

آسپرژیلوس نایجر با MIC کوچکتر و قطر هاله عدم رشد بزرگتر از مخمر کاندیدا نسبت به اسانس لعل کوهستان حساس تر می باشد. حداقل غلظت کشندگی (MBC) قارچها ۴ برابر بیشتر از MIC آن می باشد (جدول ۳). در بین باکتریهای گرم مثبت، استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس کوچکترین قطر هاله عدم رشد را نشان می دهد (۱۳ میلی متر) (جدول ۱). اثر اسانس لعل کوهستان بر باکتریهای گرم منفی در مقایسه با سایر میکروارگانیسمها کمتر است (میانگین قطر هاله عدم رشد ۱/۸ میلی متر) و پسودوموناس آئروجینوزا کوچکترین قطر هاله عدم رشد را در بین میکروارگانیسمهای مطالعه شده نشان می دهد (۸ میلی متر). کلبسیلا پنومونیا (قطر هاله عدم رشد برابر با ۳۰ میلی متر)، ویبریوکلا (۲۸/۶ میلی متر) و پروتئوس

جدول ۱- بررسی اثر ضد میکروبی اسانس لعل کوهستان بر باکتریهای گرم مثبت

MBC	MIC	انحراف معیار	میانگین قطر هاله عدم رشد (میلی متر)	سویه باکتری
( $\mu l/ml$ )	( $\mu l/ml$ )			
>۲	۰/۵	۱/۶۳	۱۸	<i>B. subtilis</i>
>۲	۰/۲۵	۱/۷	۲۶/۳	<i>B. cereus</i>
۰/۲۵	۰/۱۲۵	۰	۲۲	<i>S. saprophyticus</i>
۰/۲۵	۰/۲۵	۱/۴۹	۳۰/۶	<i>S. aureus</i>
۰/۵	۰/۲۵	۰/۸	۱۳	<i>S. epidermidis</i>
۰/۲۵	۰/۲۵	۲/۱۶	۲۲	<i>L. monocytogenes</i>
		۵/۴۴	۲۱/۹	میانگین اثر بر گرم مثبتها



شکل ۱- مقایسه اثر اسانس لعل کوهستان بر میکروارگانیسم‌های مختلف

جدول ۲- بررسی اثر ضد میکروبی اسانس لعل کوهستان بر باکتریهای گرم منفی

MBC ( $\mu\text{l/ml}$ )	MIC ( $\mu\text{l/ml}$ )	انحراف معیار	میانگین قطر هاله عدم رشد (میلی متر)	سویه باکتری
۰/۵	۰/۵	۰/۹۴	۱۴/۶	<i>Sh. flexeneri</i>
۰/۵	۰/۵	۰	۱۰	<i>S. typhi</i>
۰/۵	۰/۵	۰	۱۲	<i>E. coli</i>
۱	۰/۵	۰	۸	<i>P. aeruginosa</i>
۰/۰۶۲۵	۰/۰۶۲۵	۰	۳۰	<i>K. pneumoniae</i>
۰/۵	۰/۵	۰/۹۴	۱۲/۶	<i>Sh. dysantri</i>
۰/۵	۰/۵	۰	۱۲	<i>E. aeruginosa</i>
۰/۵	۰/۲۵	۳/۸	۳۸/۳	<i>V. cholerae</i>
۰/۵	۰/۵	۳/۴	۲۸/۶	<i>P. vulgaris</i>
		۱۰/۲	۱۸/۴	میانگین اثر بر گرم منفی‌ها

جدول ۳- بررسی اثر ضد میکروبی اسانس لعل کوهستان بر قارچها

MBC ( $\mu\text{l/ml}$ )	MIC ( $\mu\text{l/ml}$ )	amphotricinB 100U/disc	انحراف معیار	میانگین قطر هاله عدم رشد (میلی متر)	سویه قارچ
۰/۲۵	۰/۰۶۲۵	۱۰	۲/۴	۴۵/۳	<i>A. niger</i>
۰/۲۵	۰/۰۶۲۵	۸	۴/۹	۲۷/۳	<i>A. flavus</i>
۰/۵	۰/۲۵	۱۷	۰/۸۱	۳۲	<i>C. albicans</i>
			۷/۴	۳۴/۸۶	میانگین اثر بر قارچها

## بحث

نگاهی اجمالی به نتایج بدست آمده در این مطالعه، نشان می‌دهد که اسانس استخراج شده از اندام هوایی گیاه لعل کوهستان در مقایسه با اسانس استخراج شده از گل‌های گیاه (Sajadi & Hosseini, 2002؛ نجف‌پور نوایی و میرزا ۱۳۸۱؛ Amin et al., 2005) دارای درصد کمتری تیمول ۲۶/۹٪، کارواکرول ۰/۲۵٪ و گاما-ترپینن ۱۱٪ و درصد بیشتری پاراسیمن (۱۳/۳٪) می‌باشد. همچنین بازده اسانس گزارش شده در مطالعات متعدد متفاوت است. گاما-ترپینن و پاراسیمن پیش‌ساز زیستی تیمول و پاراسیمن پیش‌ساز تیمول و کارواکرول در گیاه است و تیمول ایزومری از کارواکرول است. تغییر در میزان اجزای اسانس به عوامل مختلفی از جمله شرایط کشت، زمان جمع‌آوری و اندام مورد استفاده بستگی دارد و ممکن است بر خاصیت ضد میکروبی آن اثر گذار باشد. مقایسه اثر ضد میکروبی اسانس حاصل از اندام هوایی گیاه با اثر ضد میکروبی اسانس حاصل از گل‌های گیاه (Amin et al., 2005) نشان می‌دهد هر دو نوع اسانس دارای فعالیت ضد میکروبی خوبی در مقابل طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها هستند، اما تغییر در میزان اجزای اسانس بر فعالیت ضد میکروبی آن در برابر ارگانیسم‌های مختلف اثر می‌گذارد. نتایج حاصل از تحقیقات ما، نشان می‌دهد که اسانس لعل کوهستان، دارای اثر ضد قارچی بسیار مطلوبی است، به نحوی که اثر  $2 \mu\text{l}$  از این اسانس از اثر آموتریسین B بر مخمر و قارچ‌های مطالعه شده و باکتری‌های گرم مثبت و منفی به مراتب بیشتر است. در حالی که نتایج مطالعه قبلی (Amin et al., 2005) نشان می‌دهد که میزان حساسیت باکتری‌های گرم مثبت و منفی (حداقل غلظت مهارکنندگی رشد) نسبت به اسانس

حاصل از گل‌های گیاه برابر است و از حداقل غلظت مهارکننده رشد برای قارچ و مخمر مطالعه شده کوچکتر است، این بدین معنی است که باکتری‌ها در مقایسه با قارچ‌ها نسبت به اسانس حاصل از گل حساس‌ترند. مقایسه اجزای دو اسانس نشان می‌دهد که درصد کارواکرول در اسانس حاصل از اندام هوایی بسیار ناچیز است، اما این مقدار در اندام گل از ۲۹٪-۲۲٪ گزارش شده است. تیمول مهمترین جزء اسانس در اندام هوایی گیاه است. ماده مذکور با ادامه حیات و تشکیل هیف‌های قارچی تداخل می‌نماید و در غشای سلول کاندیدایی و متابولیسم آن اثر می‌گذارد و احتمالاً بر دیواره سلول قارچی نیز مؤثر است (Braga et al., 2007).

گاما-ترپینن و پاراسیمن فاقد اثرهای ضد میکروبی هستند (Cosentino et al., 1999)، در حالی که تیمول و کارواکرول از ترکیبات فنلی، دارای اثرهای ضد میکروبی بسیار خوبی می‌باشند (Botelho et al., 2007). با توجه به نکات ذکر شده، به نظر می‌رسد که اثر قارچ‌کشی اسانس حاصل از اندام هوایی گیاه مربوط به محتوی تیمول آن است که مطابق با نتایج دیگر محققان است (Zambonelli et al., 2004). نتایج نشان می‌دهد که هر چه قدر میزان تیمول در اسانس بیشتر باشد اثر قارچ‌کشی آن بیشتر است.

کاهش میزان کارواکرول در اسانس حاصل از اندام هوایی و افزایش میزان پاراسیمن میزان اثربخشی اسانس را بر باکتری‌های گرم منفی کاهش می‌دهد. علت این تفاوت شاید به خاطر تفاوت در ساختار دیواره سلولی باکتری‌های گرم منفی است. در باکتری‌های گرم منفی به علت وجود لیپوپلی‌ساکاریدهای دیواره سلولی و انتشار عوامل ضد میکروبی به خارج سلول (Mckeegan et al, 2002) اثر

میکروبی باشند، اما مطالعات نشان می‌دهد که گاهی ترکیب اجزای اصلی اسانس اثر ضد میکروبی کمتری نسبت به ترکیب کل اسانس دارند (Lattaoui & Tantaoui-Elaraki, 1994). بنابراین، حضور سایر اجزاء در میزان کم می‌تواند بر اثر ضد میکروبی اسانسها اثر گذار باشد. به‌طور کلی، در این مطالعه مشخص گردید که میکروارگانسیم‌ها، بسته به اینکه چه ساختاری دارند، از نظر مقاومت یا حساسیت نسبت به یک اسانس خاص و یا اجزای آن با یکدیگر تفاوت دارند. باکتریهای اسپوردار نسبت به سلولهای رویشی و باکتریهای گرم منفی نسبت به باکتریهای گرم مثبت نسبت به اسانس لعل کوهستان مقاوم‌ترند. اسانس لعل کوهستان بر روی تعدادی از میکروارگانسیم‌ها اثر مهاری و تعدادی دیگر، اثر باکتری‌کشی دارد. با توجه به اثرهای ضد میکروبی این اسانس بر طیف وسیعی از میکروارگانسیم‌ها، لازم است مطالعات بیشتری پیرامون اثربخشی این اسانس بر سویه‌های بالینی میکروبی انجام پذیرد و توانایی این ترکیب به‌عنوان یک ترکیب ضد میکروب در مدل‌های حیوانی بررسی گردد.

### سیاسگزاری

نویسندگان این مقاله از جناب آقای مهندس حسین حجازی مدیر عامل محترم شرکت داروسازی که همواره پشتیبان تحقیقات بوده‌اند و همچنین از خانم نسترن کاظم‌پور و آقای مهندس محسن بذرافشان قدردانی می‌نمایند.

### منابع مورد استفاده

- مظفریان، و، ۱۳۸۲. فلور خوزستان. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خوزستان، ۲۸۳ صفحه.

ضد میکروبی اسانس کمتر می‌شود (Rossel, 1991). لیپوپلی‌ساکاریدهای موجود در دیواره سلولی مانع از رسیدن ترکیبهای فعال به غشای سیتوپلاسمی باکتریهای گرم منفی می‌شود. تیمول و کارواکرول هر دو به غشای بیرونی باکتریهای گرم منفی آسیب می‌زند و قابلیت نفوذپذیری غشای سلولی را افزایش می‌دهد و منجر به تراوش ATP می‌گردد. کارواکرول دارای اثر ممانعت از ATPase می‌باشد. کارواکرول در *E. coli* O<sub>157</sub>H<sub>7</sub> تولید HSP60 را القاء می‌نماید و از سنتز فلاژلین ممانعت می‌کند (Burt et al., 2007). اثر سینرژیستی بین تیمول و کارواکرول در مورد بعضی باکتریها گزارش شده است (Didry et al., 1993). کارواکرول به‌عنوان یک ترکیب باکتریوسید عمل می‌کند و عملکرد آن به غلظت و زمان تماس آن با میکروارگانسیم بستگی دارد. کارواکرول با غشای سلولی از طریق تغییر در نفوذپذیری کانالهای H<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> واکنش می‌دهد. تغییر در شیب یونی منجر به توقف و اختلال عملکردهای اساسی سلول و مرگ آن می‌گردد (Ultee et al., 1999). کاهش پاراسیمین در اسانس حاصل از گل اثر ضد باکتریایی آن را افزایش می‌دهد، زیرا پاراسیمین و اجزای فنلی (تیمول و کارواکرول) دارای اثرهای آنتاگونیستی بر روی میکروارگانسیم‌ها می‌باشند، به‌طوری که افزایش در میزان پاراسیمین همراه با ترکیبهای فنلی، اثر ضد باکتریایی اسانس را کاهش می‌دهد (Cosentino et al., 1999). به‌همین دلیل، اثر ضد باکتریایی اسانس حاصل از اندام هوایی گیاه کاهش می‌یابد درحالی که افزایش تیمول همراه با کارواکرول در اسانس حاصل از گل، منجر به افزایش فعالیت ضد باکتریایی آن گردیده است. اگرچه اجزای اسانس به تنهایی ممکن است فاقد اثر ضد



- main components of three thyme essential oils. *Revista Italinica EPPOS*, 13:13-19.
- Mahboobi, M., Shahcheraghi, F. and Feizabadi, M.M., 2006. Bactericidal effects of essential oils from Clove, Lavander and geranium on multi-drug resistant isolates of *P.aeruginosa*. *Iranian journal of Biotechnology*, 4(2): 137-140.
- McKeegan, K.S., Borges-Walmsley, M.I. and Walmsley, A.R., 2002. Microbial and viral drug resistance mechanisms. *Trends in Microbiology*, 10: 85-145.
- Nascimento, G.G.F., Locatelli, J., Freitas, P.C. and Silva, G.L., 2000. Antibacterial activity of extracts and phytochemicals on antibiotic resistant bacteria. *Brazilian Journal of Microbiology*, 31(4): 245-256.
- NCCLS, National Committee for Clinical laboratory Standards, 2006. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically; 7th Ed, Approved Standard M7-A7, Wayne, Pennsylvania.
- Rana, B.K., Singh, U.P. and Taneja, V. 1997. Antifungal and kinetics of inhibition by essential oil isolated from leaves of *Aegle marmelos*. *Journal of Ethnopharmacology*, 57(1): 29-34.
- Rossel, A.D., 1991. Mechanisms of bacterial resistance to non antibiotics: food additives and pharmaceutical preservatives. *Applied microbiology*, 71: 191-201.
- Sajadi, S.E. and Hoseini, S.A., 2002. Essential oil constituents of *O.decumbens* Vent. *Journal of Essential Oil Research*, 14(3): 220-221.
- Srinivasan, D., Nathan, S., Suresh, T. and Perumalsamy, P.L., 2001. Antimicrobial activity of certain Indian medicinal plants used in Folkloric medicine. *Journal of Ethnopharmacology*, 74: 217-220.
- Ultee, A., Kets, E.P.W. and Smid, E.J., 1999. Mechanism of action of carvacrol on the food borne pathogen *Bacillus cereus*. *Applied and Environmental Microbiology*, 65(10): 4606-4610.
- Zambonelli, A., D'Aulerio, A.Z., Severi, A., Benvenuti, S., Maggi, L. and Bianchi, A., 2004. Chemical composition and Fungicidal activity of commercial essential oils of *Thymus vulgaris* L. *Journal of Essential Oil Research*, 16(1): 69-74.
- نجف پور نوایی، م. و میرزا، م.، ۱۳۸۱. بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس *Oliveria decumbens*. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۱۵: ۲۳-۲۹.
- Amin, G.H., Salehi sourmaghi, M.H., Zahedi, M., Khanavi, M. and Samadi, N., 2005. Essential oil composition and antimicrobial activity of *Oliveria decumbens*. *Fitoterapia*; 76(7-8): 704-707.
- Ayliffe, G.A., Green, W., Livingston, R. and Lowburry, E.J.L., 1997. Antibiotic resistant *staphylococcus aureus* in dermatology and burn wards. *Journal of Clinical Pathology*, 30: 40-44.
- Botelho, M.A., Nogueira, N.A.P., Bastos, G.M., Fonseca, S.G.C., Lemos, T.L.G., Matos, F.J.A., Montenegro, D., Heukelbach, J., Rao, V.S. and Brito, G.A.C., 2007. Antimicrobial activity of the essential oil from *Lippia sidoides*, Carvacrol and thymol against oral pathogens. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 40: 349-356.
- Braga, P.C., Alfieri, M., Culici, M. and Dalsasso, M., 2007. Inhibitory activity of thymol against the formation and viability of *Candida albicans* hyphae. *Mycoses*, 50(6):502-6.
- Burt, S.A., Zee, R.V.D., Koets, A.P., Graaff, A.M.D., Knapen, F.V., Gaastra, W., Hagsman, H.P. and Veldhuizen, E.J.A., 2007. Carvacrol Induces Heat Shock Protein 60 and Inhibits synthesis of flagellin in *Escherichia coli* O157:H7. *Applied and Environmental Microbiology*, 73(14): 4484-4490.
- Cowan, M.M., 1999. Plant products as antimicrobial agents. *Clinical Microbiology Review*, 12: 564-582.
- Cosentino, S., Tuberoso, C.I.G., Pisano, B., Satta, M., Mascia, V., Arzedi, E. and Palmas, F., 1999. *In-vitro* antimicrobial activity and chemical composition of Sardinian *Thymus* essential oils. *Letters in Applied Microbiology*, 29: 130-135.
- Didry, N., Dubreuil, L. and Pinkas, M., 1993. Antimicrobial activity of thymol, Carvacrol and cinnamaldehyde alone or in combination. *Pharmazie*, 48: 301-304.
- Dupont, B.F., Dromer, F. and Improvisi, L., 1996. The problem of resistance to azoles in *Candida*. *Journal of Medical Mycology*, 6(II): 12-19.
- Lattaoui, N. and Tantaoui-Elaraki, A., 1994. Individual and combined antibacterial activity of the

## Antimicrobial activity and chemical composition of essential oil from *Oliveria decumbens* Vent.

M. Mahboubi<sup>1\*</sup>, M.M. Feizabadi<sup>2</sup>, G. Haghi<sup>3</sup> and H. Hosseini<sup>4</sup>

1- Department of Microbiology, Barij Essence Pharmaceutical Company, Kashan, Iran, Email: Mahboubi@barijessence.com

2- Department of Microbiology, Faculty of Medical Sciences, University of Tehran, Iran.

3- Department of Phytochemistry, Barij Essence Pharmaceutical Company, Kashan, Iran.

4- Department of Agriculture, Barij Essence Pharmaceutical Company, Kashan, Iran.

### Abstract

*Oliveria decumbens* Vent. (Umbelliferae) is a shrub commonly found in the South East of Iran. Its aerial part is extensively used in herbal medicine. In this study, the antimicrobial activity of *O. decumbens* essential oil extracted from aerial parts of plant against a panel of microorganisms including gram positive, gram negative bacteria, yeast and fungi were assessed by disc diffusion method and micro broth dilution assay. The chemical constituents of this oil was analyzed by GC. The main components of essential oil are thymol (26.9%), carvacrol (0.25%), p-cymene (13.3%) and  $\gamma$ -terpinene (11%). This oil exhibited strong antifungal activity against filamentous fungi and yeast with average of inhibition zone (AIZ) 34.86 and  $MIC \leq 0.25 \mu\text{l ml}^{-1}$ . The effect of 2  $\mu\text{l}$  of essential oil ( $IZ \geq 27.3$  mm) is larger than Amphotricin B ( $IZ \leq 17$ ) against fungi. The gram positive bacteria are more sensitive than gram-negative bacteria (21.9 Vs 18.4). Spore forming bacteria (*Bacillus* sp.) are resistant to essential oil and the effect of oil against *Bacillus* sp. had inhibitory effect ( $MIC > 2 \mu\text{l ml}^{-1}$ ). *Pseudomonas aeruginosa* were more resistant than others ( $IZ < 8$  mm). Thus, microorganisms differ in their resistance to *O. decumbens* oil, i.e. bacteria are more resistant than fungi and gram negative bacteria are more resistant than gram positive bacteria. These effects are more concerned to phenol components especially thymol. Therefore, further studies are required to evaluate *in vivo* efficacy.

**Key words:** Antimicrobial activity, *Oliveria decumbens* Vent., bacteria, fungi, yeast, thymol.

Surf and download all data from SID.ir: [www.SID.ir](http://www.SID.ir)

Translate via STRS.ir: [www.STRS.ir](http://www.STRS.ir)

Follow our scientific posts via our Blog: [www.sid.ir/blog](http://www.sid.ir/blog)

Use our educational service (Courses, Workshops, Videos and etc.) via Workshop: [www.sid.ir/workshop](http://www.sid.ir/workshop)