

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری STES



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دوره ترمین

کارگاه آنلاین
بررسی مقابله ای متون (مقدماتی)

دوره ترمین

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

دوره ترمین

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

بررسی انحراف‌های کروموزومی در کارسینوم داکتال مهاجم پستان به روش هیبریدیزاسیون ژنومی مقایسه‌ای

چکیده

زمینه و هدف: نتوپلاسم‌ها حاصل تجمع انحراف‌های ژنی ناشی از آسیب‌های ژنی غیر کشنده می‌باشند. شناسایی انحراف کروموزومی، جایگاه ژن‌های کارسینوژن را در کروموزوم مشخص می‌کند. روش هیبریدیزاسیون ژنومی مقایسه‌ای (CGH) امکان غربالگری تمام کروموزوم‌های منفرد را از جهت شناسایی و محل قرارگیری تغییرات DNA Copy Number فراهم می‌کند. **روش بررسی:** ۲۰ نمونه کارسینوم مهاجم داکتال پستان که جهت frozen section ارسال شده بود با روش هیبریدیزاسیون ژنومی بررسی شد و انحراف کروموزومی با یافته‌های ایمونو هیستوشیمی و پاتولوژی مقایسه شد. **یافته‌ها:** در چهار نمونه به علت فقدان کیفیت مطلوب هیبریدیزاسیون امکان ارزیابی وجود نداشت و از مطالعه حذف شدند. در چهار نمونه طرح CGH نرمال و در ۱۲ نمونه دیگر در مجموع ۲۱ مورد انحراف کروموزومی یافت شد که شامل +۱q، +۱۷q، +۸q، +۲۰q، -۱۳q، -۱۱q، -۲۲q، -۱p، -۱۶q و -۸p بود. شایع‌ترین انحراف یافت‌شده +۱q، +۱۷q، +۸q و -۱۳q بود که با مطالعات قبلی مطابقت داشت. **نتیجه‌گیری:** انحراف‌های کروموزومی -۲۲q و -۱p در مطالعات قبلی بر روی کانسر پستان گزارش نشده بود. در این مطالعه انحراف -۱۳q در سه تومور یافت شد که هر سه با متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغل همراه بودند. تعداد انحراف کروموزومی در تومورهای همراه با متاستاز به غدد لنفاوی ۱/۵ انحراف و در تومورهای بدون متاستاز یک انحراف به ازاء هر تومور بود.

کلمات کلیدی: کارسینوم داکتال مهاجم پستان، هیبریدیزاسیون ژنومی مقایسه‌ای (CGH).

پیمان نوشیروان پور^{۱*}
فرخ تیرگری^۱
سعید رضا غفاری^۲
افشین عبدی راد^۱

۱. گروه پاتولوژی
۲. گروه ژنتیک

انستیتو کانسر مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)
تهران

* نویسنده مسئول: قائمشهر، خیابان کارگر (ساری)،
بیمارستان ولیعصر (عج)، بخش پاتولوژی.
تلفن: ۰۱۱۳-۳۳۳۰۳۵
email: dr_n_payman@yahoo.com

مقدمه

بردن تنظیم چرخه سلولی و ایجاد ناپایداری ژنتیکی منجر به تغییراتی در سلول از جمله افزایش بروز انکوژن‌ها، کاهش بروز یا عملکرد ژن‌های سرکوب‌کننده تومور و افزایش پروتئین‌های چرخه سلول می‌شوند که زمینه را برای ایجاد تومور بدخیم فراهم می‌کند.^۱ آسیب‌های ژنتیکی می‌توانند جزئی بوده و یا با تغییرات ساختاری کروموزومی همراه باشند. شناسایی انحراف‌های کروموزومی، محل‌هایی از کروموزوم را که می‌توانند جایگاه ژن‌های دخیل در کارسینوژن باشند، مشخص می‌کند. برخی از انحراف‌های کروموزومی می‌توانند برای نوعی از تومور و یا نحوه خاصی از رفتار و سیر بالینی آن اختصاصی باشند.^{۲-۵} روش‌های شناسایی انحراف‌های کروموزومی عبارتند از کاربوتایپ، Fluorescence Insitu Hybridization (FISH)، Allele typing، Comparative Genomic Hybridization (CGH) و غیره.^۲ CGH ارزیابی مقایسه‌ای بین دو منبع متفاوت DNA برای یک منبع سوم می‌باشد و امکان غربالگری تمام کروموزوم‌های منفرد را از

نتوپلاسم‌ها حاصل تجمع انحراف‌های ژنی متنوع هستند. آسیب‌های ژنتیکی غیر کشنده می‌تواند در اثر عوامل مختلف مانند پرتوهای یونیزان، مواد شیمیایی، ویروس‌ها و غیره ایجاد شود و یا در یک رده سلول زا یا به ارث برسد. ژن‌هایی که به‌طور عمده در فرایند کارسینوژن هدف این آسیب‌ها قرار می‌گیرند پروتوانکوژن‌های پیش‌برنده رشد، ژن‌های سرکوب‌کننده، سرطان ژن‌های تنظیم‌کننده مرگ برنامه‌ریزی شده سلول و ژن‌های تنظیم‌کننده ترمیم DNA می‌باشد.^{۱،۲} کانسر پستان از شایع‌ترین بدخیمی‌های زنان در سراسر دنیا است که تقریباً از هر ۹ زن یک نفر در طول عمر خود به آن مبتلا می‌شود.^۳ اگر چه همراهی تومور با برخی عوامل ژنتیکی، جغرافیایی محیطی، خانوادگی، پرتوهای یونیزان و بیماری‌های پرولیفراتیو پستان مشاهده شده اما همچون سایر نتوپلاسم‌ها اتیولوژی و پاتوژنز اصلی ناشناخته است. احتمالاً عوامل مختلف با از بین

Germany) برای DNA تومور و Biotin-Nick Translation Mix (Roche) برای DNA کنترل نشانه گذاری شدند. بعد از ۹۰ دقیقه قرار دادن در دمای 15°C به هر یک، ۱ میکرولیتر EDTA نیم مولار (با PH برابر هشت) اضافه و به مدت ده دقیقه در دمای 65°C قرار داده شد. سپس محتویات هر دو لوله با هم مخلوط و به آن دو میکرولیتر Cot Human DNA (Roche) و دو میکرولیتر استات سدیم سه مولار اضافه و در نهایت به آن ۸۸ میکرولیتر اتانول مطلق اضافه شد. گستره های کروموزوم متافازی طبق دستورالعمل استاندارد از نمونه کشت سلولی خون محیطی یک مرد سالم داوطلب تهیه شد. گستره های مناسب با بررسی اسلایدها توسط میکروسکوپ فاز کنتراست انتخاب شد. ده میکرولیتر از مخلوط DNA نشاندار شده به گستره ها اضافه شد و اسلایدها بعد از پوشانده شدن با cover slip به مدت سه دقیقه در حرارت 75°C قرار داده شد و پس از آن به مدت چهار روز در دمای 37°C درجه نگهداری شد. جهت انجام هیبریدیزاسیون، اسلایدها به مدت دو دقیقه در محلول 0.4XSSC با دمای 72°C و 30 ثانیه در محلول IXPBD قرار داده شد و ۵۰ میکرولیتر Rhodamin Anti Dig/FITC Avidin اضافه و بعد از پوشاندن سطح اسلاید به مدت ۳۰ دقیقه در حرارت 37°C و در دو نوبت به مدت دو دقیقه در محلول IXPBD در دو ظرف جداگانه قرار داده شد و سپس ۱۵ میکرولیتر 4,5-diamidino-2-phenylindole (DAPI) جهت رنگ آمیزی اضافه شد. بعد از پوشاندن سطح لام با cover slip و قرار دادن به مدت ۲۰ دقیقه در دمای 4°C مورد آنالیز قرار گرفت. برای digital image analysis، اسلایدها توسط epifluorescence microscope (Ziss, AxioStar) مجهز شده به فیلترهای متناسب برای FITC، DAPI و Rhodamin آنالیز شد. تصاویر به وسیله CCD camera از ۳-۴ گستره متافازی با شدت فلورسانس بالا و هیبریدیزاسیون یکنواخت اخذ و CGH peak profile با نرم افزار Leica Q CGH ارزیابی شد. نسبت شدت فلورسانس قرمز به سبز برای هر کروموزوم محاسبه و موارد بالای $1/2$ به عنوان gains و کمتر از $0/8$ به عنوان losses در نظر گرفته شد که در نتیجه و بحث با علامت (+) و (-) بیان می شود.

یافته ها

از ۲۰ مورد نمونه کانسر پستان نتایج CGH در چهار مورد از کیفیت مطلوب برخوردار نبود که از مطالعه حذف شد. از ۱۶ مورد باقیمانده

جهت شناسایی و محل قرارگیری تغییرات DNA copy number فراهم می کند. این روش نیاز به کشت سلولی نداشته و بر روی نمونه های بافتی تازه، منجمد، فیکس شده در فرمالین و قالب گیری شده در پارافین نیز قابل انجام است. از CGH در شناسایی انحراف های کروموزومی در تومورهای آستروسیتیک مغز، کانسرهای کولورکتال، مری و سر و گردن، آدنوکارسینوم معده، کارسینوم هپاتوسلولر و اندومتر، کوریوکارسینوما و کانسر پستان استفاده شده است. ۱۳-۲۰ همراهی انحراف کروموزومی با زیرگروه های خاص هیستوپاتولوژیک و یا سیر بالینی مشاهده شده و وجود chromosomal gains در ناحیه ۸q و ۲۰q^۴ در بسیاری از تومورهای تیوپر و یا همراه chromosomal losses در ناحیه ۱۳q با درگیری غدد لنفاوی زیر بغل در کانسر پستان دیده می شود. ۴ در این مطالعه کارسینوم داکتال پستان با یا بدون درگیری غدد لنفاوی زیر بغل جهت شناسایی تغییرات DNA copy number و جایگاه های انحراف کروموزومی با تکنیک CGH برای اولین بار در کشور مورد بررسی قرار گرفتند.

روش بررسی

این مطالعه به روش توصیفی جهت شناسایی و بررسی نوع و نحوه بروز انحراف های کروموزومی در کانسر پستان طراحی و اجرا شد. معیارهای ورود به مطالعه کارسینوم داکتال مهاجم پستان، در دسترس بودن بافت تازه از تومور، مشخص بودن متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغل، تشخیص تومور برای اولین بار و عدم سابقه رادیوتراپی و یا کموتراپی بود. ۲۰ مورد کانسر پستان که نمونه جهت frozen section به بخش پاتولوژی انستیتو کانسر بیمارستان امام ارسال شده بود در مطالعه وارد شدند نمونه ها به نحوی انتخاب شدند که شامل موارد همراه با متاستاز به غده لنفاوی زیر بغل و نیز موارد بدون متاستاز باشد. وضعیت درگیری غدد لنفاوی زیر بغل و وضعیت ER، PR، p^{۵۳}، Her2 مشخص شد. قطعه ای از بافت تازه تومورال به نحوی که در فرایند تشخیص تداخل ننماید از نمونه جدا و فوراً در دمای 80°C قرار داده شد. DNA از بافت تومورال با هضم توسط Proteinase K و به دنبال آن phenol-chloroform extraction مطابق پروتکل استاندارد استخراج شد. DNA مرجع نیز از سلولهای خون محیطی یک مرد سالم داوطلب به دست آمد. DNA تومور و مرجع توسط روش nick translation با استفاده از Dig-Nick translation Mix (Roche Co.)

جدول ۲: مشخصات IHC تومورهای همراه با انحراف کروموزومی

شماره نمونه	ER	PR	P53	Her2	انحرافهای کروموزومی
۲	+	+	+	+۲	۱۷q+
۳	-	-	+	+۳	۱۳q-، ۱q+
۵					۲۰q+
۸	+	+	-	+۱	۸q+
۹	+	+	-	۰	۱۳q-
۱۰	+	+	+	۰	۲۲q-، ۱۷q+
۱۱	-	-	+	۰	۱q+، ۸q+، ۱۱q-
۱۲	+	+	+	۰	۱p-
۱۳					۱۳q-، ۱۷q+
۱۴	+	-	-	+۲	۱q+، ۱۶q-، ۸p-
۱۵	+	+	+	+۲	۱q+، ۱۱q-
۱۶	+	+	+	+۱	۸q+، ۲۲q-

chromosomal loss یافت شده ۱۳q- در تومورهای آستروسیتیک مغز، SCC مری و سر و گردن، HCC، ۱۵q۲۱ و ۲۲q۲۴ و ۲۵p- در تومورهای آستروسیتیک مغز، ۲۲q- در HCC و فیبروآدنوم ۱۵q۱۶ و ۲۱q۲۴ و ۸q- در آدنوکارسینوم معده و HCC و کوریوکارسینوم ۱۵q۲۰ و ۲۲q- در کارسینوم کولورکتال^{۱۸} گزارش شده است. در چهار نمونه از تومورهای مورد بررسی طرح CGH نرمال بود که می تواند ناشی از تغییرات جزئی ژنتیکی بدون ایجاد تغییر در سطح کروموزومی و یا تغییرات کروموزومی بدون تغییر در DNA copy number باشد. در بررسی موارد با طرح CGH نرمال و نیز مقایسه با موارد همراه با انحرافهای کروموزومی یافته‌های هیستوپاتولوژیک و ایمونوهیستوشیمی متنوع و مشابه در هر دو گروه دیده می شود. از نظر تعداد انحرافهای کروموزومی یافت شده میانگین تعداد انحرافهای کروموزومی در تومورهای با درگیری غدد لنفاوی زیر بغل ۱/۵ انحراف به ازاء هر تومور و در موارد بدون متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغل یک انحراف به ازاء هر تومور بود. به نظر می رسد که تعداد انحرافهای کروموزومی در یک تومور می تواند با رفتار تومور ارتباط داشته باشد. از جمله در یک مطالعه وجود تعداد انحرافهای کروموزومی بیشتر در تومورهای بدون درگیری غدد لنفاوی با موارد بیشتری از عود زودرس تومور همراه بود^۴ و در مطالعه‌ای دیگر بیان شد که تفاوت تومور و متاستاز از نظر انحرافهای کروموزومی یافت شده بیشتر از نواحی مختلف تومور اولیه است.^{۳۲} هر سه مورد ۱۳q- در این مطالعه در تومورهای همراه با متاستاز به غده لنفاوی زیر بغل دیده شد که با مطالعات قبلی مطابقت دارد.^۴ ناحیه ۲۲-۲۱ ۱۳q به عنوان ناحیه کاندید برای وجود چند ژن سرکوب کننده تومور

بیان شده است.^{۳۸} ۱۶q- نیز از موارد ذکر شده در همراهی با متاستاز به غده لنفاوی است^{۳۹} که در این مطالعه تنها مورد ۱۶q- نیز با متاستاز همراهی داشت. در مطالعه‌ای بر روی SCC مری وجود ۸q۲۴، ۲۰q۱۲، ۲۳-۱۱q۲۲- در همراهی با متاستاز به غده لنفاوی گزارش شده بود.^{۲۴} اما در مطالعه حاضر انحرافهای کروموزومی ذکر شده در هر دو گروه موارد با و بدون متاستاز به غده لنفاوی زیر بغل دیده شد. انحراف کروموزومی ۲۰q+ از انحرافهای شایع گزارش شده در کانسر پستان و سایر تومورهای بدخیم توپر است.^{۹-۱۲} همراهی این انحراف کروموزومی با کانسرهای پستان ER+ بیشتر از موارد ER- گزارش شده است^۴ و جالب است که بدانیمن ژن Amplified in breast cancer 1 (AIB1) در ناحیه ۲۰q۱۲ قرار دارد و در رابطه با گیرنده‌های هسته‌ای مانند ER و افزایش نسخه‌برداری وابسته به استروژن از ژن cyclin D1 می باشد.^۴ در یک مطالعه تومورهای پستان با ۸q+ و ۲۰q۱۳+ با پیش آگهی ضعیف تر و عود بیشتر همراه بودند.^{۳۰} حذف در ناحیه ۱۱q۱۳ و تقویت ناحیه لکوس cyclin D₁ در تومور پستان در خانمهای زیر ۴۰ سال بیشتر دیده شده است.^{۳۱} در تعدادی از مطالعات کانسرهای پستان دوطرفه مورد بررسی قرار گرفتند که انحراف کروموزومی شاخص در این رابطه یافت نشد.^{۲۹} در مطالعه حاضر مقایسه‌ای از نظر سن بیمار و نوع انحراف کروموزومی انجام نشد و موردی از تومور دو طرفه وجود نداشت. علی‌رغم خوش خیم در نظر گرفته شدن ژینکوماستی همراهی آن با ۴۰٪ کارسینومهای پستان در مردان ذکر شده است^۳ این مطلب می تواند توجیه کننده گزارش برخی انحرافهای کروموزومی از جمله ۸q+، ۱۱p+، ۴q-، ۱q- در ژینکوماستی در تعدادی از مطالعات باشد.^{۳۲} در کانسر مهاجم پستان مردان ۱۱p+، ۸q+، ۱۷p+، ۱q+، ۲۰q+، ۱۳q-، ۶p-، ۸p- و ۹q- گزارش شده است که مشابه موارد گزارش شده در کانسر پستان خانمها است.^{۳۳} انحرافهای کروموزومی ۱p- و ۲۲q- در این مطالعه در تحقیقات قبلی در کانسر پستان گزارش نشده بود. تمام موارد ۱۳q- در این مطالعه در تومورهای با متاستاز به غده لنفاوی زیر بغل دیده شد که با مطالعات قبلی مطابقت داشت. این تومورها با تعداد بیشتری از انحرافهای کروموزومی همراه بودند. در کنار نتایج به دست آمده با راه اندازی تکنیک CGH در این مطالعه که برای اولین بار در کشور انجام شد امکان بررسی تومورهای بدخیم از جهت شناسایی انحرافهای کروموزومی فراهم شده است.

References

- Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Pathologic Basis of Disease. 7th ed. Philadelphia: WB Saunders: 2005.
- Oga A, Kawauchi S, Izumi H, Ping LX, Furuya T, Sasaki K. New perspectives for tumor pathology provided by comparative genomic hybridization. *Int J Clin Oncol* 2002; 7: 133-7.
- Rosai J, Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. 9th ed. New York: Mosby: 2004.
- Cingoz S, Altungoz O, Canda T, Saydam S, Aksakoglu G, Sakizli M. DNA copy number changes detected by comparative genomic hybridization and their association with clinicopathologic parameters in breast tumors. *Cancer Genet Cytogenet* 2003; 145: 108-14.
- Baba Y. Development of novel biomedicine based on genome science. *Eur J Pharm Sci* 2001; 13: 3-4.
- Cummins RJ, Grady AO, Sabah M, et al. Comparative genomic hybridization: emphasis on use of formalin-fixed paraffin-embedded tissue. *Curr Diag Pathol* 2003; 9: 173-8.
- Speicher MR, Howe C, Crotty P, du Manoir S, Costa J, Ward DC. Comparative genomic hybridization detects novel deletions and amplifications in head and neck squamous cell carcinomas. *Cancer Res* 1995; 55: 1010-3.
- Ried T, Just KE, Holtgreve-Grez H, du Manoir S, Speicher MR, Schröck E, et al. Comparative genomic hybridization of formalin-fixed, paraffin-embedded breast tumors reveals different patterns of chromosomal gains and losses in fibroadenomas and diploid and aneuploid carcinomas. *Cancer Res* 1995; 55: 5415-23.
- Amiel A, Kaufman Z, Goldstein E, Bruchim RB, Kidron D, Gaber E, et al. Application of comparative genomic hybridization in search for genetic aberrations in fibroadenomas of the breast. *Cancer Genet Cytogenet* 2003; 142: 145-8.
- Micci F, Teixeira MR, Heim S. Complete cytogenetic characterization of the human breast cancer cell line MA11 combining G-banding, comparative genomic hybridization, multicolor fluorescence in situ hybridization, RxFISH, and chromosome-specific painting. *Cancer Genet Cytogenet* 2001; 131: 25-30.
- Rummukainen J, Kytölä S, Karhu R, Farnebo F, Larsson C, Isola JJ. Aberrations of chromosome 8 in 16 breast cancer cell lines by comparative genomic hybridization, fluorescence in situ hybridization, and spectral karyotyping. *Cancer Genet Cytogenet* 2001; 126: 1-7.
- Larramendy ML, Lushnikova T, Björkqvist AM, Wistuba II, Virmani AK, Shivapurkar N, et al. Comparative genomic hybridization reveals complex genetic changes in primary breast cancer tumors and their cell lines. *Cancer Genet Cytogenet* 2000; 119: 132-8.
- Sinclair CS, Rowley M, Naderi A, Couch FJ. The 17q23 amplicon and breast cancer. *Breast Cancer Res Treat* 2003; 78: 313-22.
- Related Articles, LinksArmes JE, Hammet F, de Silva M, Ciciulla J, Ramus SJ, Soo WK, et al. Candidate tumor-suppressor genes on chromosome arm 8p in early-onset and high-grade breast cancers. *Oncogene* 2004; 23: 5697-702.
- Tornillo L, Carafa V, Richter J, Sauter G, Moch H, Minola E, et al. Marked genetic similarities between hepatitis B virus-positive and hepatitis C virus-positive hepatocellular carcinomas. *J Pathol* 2000; 192: 307-12.
- Ojopi EP, Rogatto SR, Caldeira JR, Barbiéri-Neto J, Squire JA. Comparative genomic hybridization detects novel amplifications in fibroadenomas of the breast. *Genes Chromosomes Cancer* 2001; 30: 25-31.
- Related Articles, LinksNishizaki T, Ozaki S, Harada K, Ito H, Arai H, Beppu T, et al. Investigation of genetic alterations associated with the grade of astrocytic tumor by comparative genomic hybridization. *Genes Chromosomes Cancer* 1998; 21: 340-6.
- Related Articles, LinksNakao K, Shibusawa M, Tsunoda A, Yoshizawa H, Murakami M, Kusano M, et al. Genetic changes in primary colorectal cancer by comparative genomic hybridization. *Surg Today* 1998; 28: 567-9.
- Nakao K, Mehta KR, Fridlyand J, Moore DH, Jain AN, Lafuente A, et al. High-resolution analysis of DNA copy number alterations in colorectal cancer by array-based comparative genomic hybridization. *Carcinogenesis* 2004; 25: 1345-57.
- El-Rifai W, Harper JC, Cummings OW, Hyytinen ER, Frierson HF Jr, Knuutila S, et al. Consistent genetic alterations in xenografts of proximal stomach and gastro-esophageal junction adenocarcinomas. *Cancer Res* 1998; 58: 34-7.
- Related Articles, LinksWalch AK, Zitzelsberger HF, Bruch J, Keller G, Angermeier D, Aubele MM, et al. Chromosomal imbalances in Barrett's adenocarcinoma and the metaplasia-dysplasia-carcinoma sequence. *Am J Pathol* 2000; 156: 555-66.
- Maruno M, Yoshimine T, Muhammad AK, Ninomiya H, Kato A, Hayakawa T, et al. Chromosomal aberrations detected by comparative genomic hybridization (CGH) in human astrocytic tumors. *Cancer Lett* 1999; 135: 61-6.
- Nishizaki T, Kubota H, Harada K, Harada K, Ito H, Suzuki M, et al. Clinical evidence of distinct subgroups of astrocytic tumors defined by comparative genomic hybridization. *Hum Pathol* 2000; 31: 608-14.
- Tada K, Oka M, Tangoku A, Hayashi H, Oga A, Sasaki K. Gains of 8q23-qter and 20q and loss of 11q22-qter in esophageal squamous cell carcinoma associated with lymph node metastasis. *Cancer* 2000; 88: 268-73.
- Ueno T, Tangoku A, Yoshino S, Abe T, Toshimitsu H, Furuya T, et al. Gain of 5p15 detected by comparative genomic hybridization as an independent marker of poor prognosis in patients with esophageal squamous cell carcinoma. *Clin Cancer Res* 2002; 8: 526-33.
- Ahmed MN, Kim K, Haddad B, Berchuck A, Qumsiyeh MB. Comparative genomic hybridization studies in hydatidiform moles and choriocarcinoma: amplification of 7q21-q31 and loss of 8p12-p21 in choriocarcinoma. *Cancer Genet Cytogenet* 2000; 116: 10-5.
- Kusano N, Okita K, Shirahashi H, Harada T, Shiraishi K, Oga A, et al. Chromosomal imbalances detected by comparative genomic hybridization are associated with outcome of patients with hepatocellular carcinoma. *Cancer* 2002; 94: 746-51.
- Ojopi EP, Cavalli LR, Cavalieri LM, Squire JA, Rogatto SR. Comparative genomic hybridization analysis of benign and invasive male breast neoplasms. *Cancer Genet Cytogenet* 2002; 134: 123-6.
- Agelopoulos K, Tidow N, Korsching E, Voss R, Hinrichs B, Brandt B. Molecular cytogenetic investigations of synchronous bilateral breast cancer. *J Clin Pathol* 2003; 56: 660-5.
- Isola JJ, Kallioniemi OP, Chu LW, Fuqua SA, Hilsenbeck SG, Osborne CK. Genetic aberrations detected by comparative genomic hybridization predict outcome in node-negative breast cancer. *Am J Pathol* 1995; 147: 905-11.
- Chunder N, Mandal S, Roy A, Roychoudhury S, Panda CK. Analysis of different deleted regions in chromosome 11 and their interrelations in early- and late-onset breast tumors: association with cyclin D1 amplification and survival. *Diagn Mol Pathol* 2004; 13: 172-82.
- Aubele M, Mattis A, Zitzelsberger H, Walch A, Kremer M, Hutzler P, et al. Intratumoral heterogeneity in breast carcinoma revealed by laser-microdissection and comparative genomic hybridization. *Cancer Genet Cytogenet* 1999; 110: 94-102.
- Tirkkonen M, Kainu T, Loman N, Jöhanntsson OT, Olsson H. Somatic genetic alterations in BRCA2-associated and sporadic male breast cancer. *Genes Chromosomes Cancer* 1999; 24: 56-61.

Chromosomal aberrations detected by comparative genomic hybridization technique (CGH) in invasive ductal carcinoma of breast

Nooshiravanpour P. *¹
Tirgari F.¹
Ghaffari S R.²
Abdirad A.¹

1- Department of Pathology
2- Department of Genetics

Cancer Institute

Tehran University of Medical
Sciences

Abstract

Background: Nonlethal genetic damage is the basis for carcinogenesis. As various gene aberrations accumulate, malignant tumors are formed, regardless of whether the genetic damage is subtle or large enough to be distinguished in a karyotype. The study of chromosomal changes in tumor cells is important in the identification of oncogenes and tumor suppressor genes by molecular cloning of genes in the vicinity of chromosomal aberrations. Furthermore, some specific aberrations can be of great diagnostic and prognostic value. Comparative genomic hybridization (CGH) is used to screen the entire genome for the detection and/or location chromosomal copy number changes.

Methods: In this study, frozen sections of 20 primary breast tumors diagnosed as invasive ductal carcinoma from the Cancer Institute of Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran, were studied by CGH to detect chromosomal aberrations. We compared histopathological and immunohistochemical findings.

Results: Hybridization in four of the cases was not optimal for CGH analysis and they were excluded from the study. DNA copy number changes were detected in 12 (75%) of the remaining 16 cases. Twenty-one instances of chromosomal aberrations were detected in total, including: +1q, +17q, +8q, +20q, -13q, -11q, -22q, -1p, -16q, -8p. The most frequent were +1q, +17q, +8q, -13q, similar to other studies. In three cases, we detected -13q, which is associated with axillary lymph node metastasis and was reported in one previous study. The mean numbers of chromosomal aberrations per tumor in metastatic and nonmetastatic tumors was 1.5 and 1, respectively. No other association between detected chromosomal aberrations and histopathological and immunohistochemical findings were seen.

Conclusion: Since intermediately to widely invasive carcinomas are more likely to have chromosomal aberrations, CGH can be a valuable prognostic tool. Furthermore, CGH can be used to detect targeting molecules within novel amplifications which holds the potential for a new therapeutic approach for intractable cancer.

Keywords: Breast cancer, comparative genomic hybridization (CGH), breast cancer, comparative genomic hybridization technique.

* Corresponding author: Vali-e-asr
Hospital, Kareger (Sari) Ave., Dept of
Pathology, Ghaemshahr, Iran.
Tel: +98-123-3232035
email: dr_n_payman@yahoo.com

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری STES



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

توجه: بررسی مقاله ای متون (مقدماتی)

کارگاه آنلاین
بررسی مقابله ای متون (مقدماتی)

PROPOSAL
پروپوزال

توجه: پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

ISI
Scopus

توجه: آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو