

SID



ابزارهای
پژوهش



سرویس ترجمه
تخصصی



کارگاه های
آموزشی



بلاگ
مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری
STES



فیلم های
آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات ISI

آموزش مهارت های کاربردی
در تدوین و چاپ مقالات ISI



روش تحقیق کمی

روش تحقیق کمی



آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

آموزش نرم افزار Word
برای پژوهشگران

بهینه سازی بیان، تخلیص و بررسی خاصیت ضد میکروبی پروتئین نو ترکیب بتا دیفنسین ۲ نوتروفیل‌های گاو

نقیسه کریمی^۱، بهناز صفار^{۱*}، کامران قائدی^۳، محسن مبینی دهکردی^۱

^۱ گروه ژنتیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ ^۲ پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ ^۳ گروه سلولی و مولکولی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

تاریخ دریافت: ۹۱/۷/۱۵ اصلاح نهایی: ۹۱/۹/۱۳ تاریخ پذیرش: ۹۱/۹/۲۰

چکیده:

زمینه و هدف: دیفنسین‌ها یکی از بزرگ‌ترین خانواده‌ی پپتیدهای ضد میکروب می‌باشند که به واسطه‌ی فعالیت بر علیه باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها به عنوان آنتی‌بیوتیک‌های نسل جدید منفعیت بسیاری دارند. هدف از این مطالعه بهینه سازی بیان، تخلیص و بررسی خاصیت ضد میکروبی پروتئین بتا دیفنسین ۲ نوتروفیل‌های گاو (BNBD2) بوده است.

روش بررسی: در این مطالعه‌ی تجربی-آزمایشگاهی باکتری اشرشیاکلی BL21(DE3) حامل وکتور pET-32a(+) که ژن BNBD2 در آن همسانه سازی شده بود جهت مطالعات مورد استفاده قرار گرفت. بیان پروتئین BNBD2 با تغییر در پارامترهای دانسیته‌ی سلولی، دمای رشد، مدت زمان القاء با استفاده از سیستم الکتروفورز عمودی (SDS-PAGE) و تست برادفورد به صورت کمی و کیفی بررسی گردید. مراحل تخلیص پروتئین نو ترکیب با کمک روش شیمیایی شکافت در جایگاه فرمیک اسید و عبور از سانتریکون و اثر ضد باکتری پروتئین تخلیص شده بر چند نمونه‌ی باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: با استفاده از محیط کشت Luria-Bertani، شروع القاء در جذب نوری ۰/۸ در طول موج ۶۰۰ نانومتر، غلظت یک میلی مولار ماده‌ی القاء کننده‌ی IPTG، دمای رشد ۳۰ درجه و مدت زمان ۴ ساعت پس از القاء بیشترین میزان بیان پروتئین به دست آمد. پروتئین نو ترکیب با استفاده از شکافت در جایگاه فرمیک اسید و عبور از سانتریکون تخلیص گردید. نتایج آزمایش وسترن بلائینگ نیز نشان داد که پروتئین نو ترکیب به طور اختصاصی به آنتی‌بادی mouse anti-(His)6 peroxidase متصل می‌گردد. تشکیل هاله‌ی عدم رشد در محیط‌های کشت مولر هینتون آگار حاوی کشت سطحی باکتری‌های مورد آزمایش خاصیت ضد باکتری این پروتئین را نشان داد.

نتیجه گیری: با توجه به خاصیت ضد میکروبی پروتئین BNBD2 و امکان بیان پروتئین در باکتری *E. coli* می‌توان به تولید انبوه این پروتئین نو ترکیب اقدام نمود.

واژه‌های کلیدی: بهینه سازی، بیان، تخلیص، پپتیدهای ضد میکروب، شکافت شیمیایی، بتا دیفنسین ۲.

مقدمه:

کننده‌های سیستم ایمنی، پاسخ سیستم ایمنی را افزایش می‌دهند (۲). پپتیدهای ضد میکروب به واسطه‌ی قابلیت کاربرد آن‌ها به عنوان آنتی‌بیوتیک‌های نسل جدید منفعیت بسیار دارند (۳،۴). این پروتئین‌ها دارای طیف وسیعی از فعالیت‌های ضد میکروبی می‌باشند و عمدتاً غشاهای میکروبی را هدف قرار می‌دهند و مانع توانایی میکروب برای توسعه‌ی مقاومت علیه آن‌ها می‌شوند.

سیستم ایمنی موجودات چند سلولی دارای پپتیدهایی کمتر از ۱۰۰ آمینو اسید می‌باشد که آن‌ها را از طیف وسیعی از میکروب‌ها (باکتری، قارچ و پروتوزوا) و ویروس‌ها محافظت می‌کند (۱). این پپتیدهای ضد میکروب همچنین به عنوان پپتیدهای دفاعی میزبان نامیده می‌شوند و به عنوان تنظیم کننده‌های سیستم ایمنی، پاسخ سیستم ایمنی را افزایش

و فعالیت ضد میکروبی علیه *اشرشیاکلی*، *استافیلوکوکوس اورئوس* و *کاندیدا آلیکنز* دارند (۱۵). پپتیدهای بتا دیفنسین ۱ تا ۱۲ گرانول‌های سیتوپلاسمی نوتروفیل‌های گاو علاوه بر بیان در مغز استخوان در اپی‌تلیوم غدد پستانی گاوهای شیر دهنده نیز بیان می‌شوند و میزان بیان آن‌ها در غدد پستانی گاو در زمان عفونی شدن با باکتری افزایش می‌یابد (۱۷،۱۶).

تکنولوژی DNA نوترکیب یک وسیله اقتصادی برای تولید پروتئین‌های نوترکیب فراهم می‌کند. حقیقتاً بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها از طریق تولید نوترکیب در تنوعی از میکرو ارگانیسم‌ها به دست آمده‌اند. در میان سیستم‌های موجود برای تولید پروتئین نوترکیب باکتری *E. coli* بیشتر به عنوان میزبان استفاده می‌شود (۱۸،۱۹). با توجه به این که درمان با آنتی‌بیوتیک‌ها، هنوز انتخاب اول برای مبارزه با عفونت‌های میکروبی در انسان و حیوانات است شیوع مقاومت باکتریایی به آنتی‌بیوتیک‌های مرسوم یک نگرانی برای سلامت عمومی می‌باشد. تولید پروتئین نوترکیب با خاصیت ضد میکروبی می‌تواند راهکاری مفید باشد (۲۰)، لذا این مطالعه با هدف بهینه سازی بیان و تخلیص پروتئین ژن BNBD2 به منظور بررسی پتانسیل آن در خاصیت ضد میکروبی این پپتیدها طراحی و اجرا شده است.

روش بررسی:

در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی از باکتری *E. coli* L21(DE3) حامل پلاسمید pET-32a(+) که ژن BNBD2 در آن همسانه سازی شده بود جهت مطالعه استفاده گردید (۲۱). جهت بررسی بیان پروتئین نسبت به رشد باکتری اقدام گردید. به این منظور ابتدا از نمونه باکتری‌های ذخیره شده (که در دمای 70°C مایع نگهداری می‌گردید) در محیط لوریا برتانی (LB)، مایع حاوی ۱۰۰ میلی گرم در میلی لیتر آنتی‌بیوتیک آمپی‌سیلین تلقیح و نسبت به رشد آن در شرایط ۱۵۰ دور و دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد اقدام شد. میزان

دیفنسین‌ها یکی از بزرگ‌ترین خانواده‌ی پپتیدهای ضد میکروبی می‌باشند (۵،۶،۷) که در مهره داران و بی‌مهرگان یافت می‌شوند و در طیفی از موجودات شامل پستانداران، پرندگان و گیاهان گزارش شده‌اند. دیفنسین‌ها بر ضد باکتری، قارچ و حتی ویروس‌های پوشش‌دار و بدون پوشش فعال می‌باشند (۸). سایر فعالیت دیفنسین‌ها شامل خاصیت کیموتاکتیک، اپسونیک و فعال کننده‌ی سلول‌های دندریتیک می‌باشد و یا ممکن است پاسخ هورمون‌ها را تعدیل کند و نقش اساسی در هر دوی ایمنی ذاتی و اکتسابی ایفا کنند (۹). ویژگی سلول‌کشی و میکروب‌کشی دیفنسین‌ها در نتیجه توانایی آن‌ها برای داخل شدن به غشاهای بیولوژیکی و واکنش‌های الکترواستاتیک با غشا باکتری و تولید منافذی است که اجازه می‌دهد یون‌های ضروری و مواد غذایی از باکتری به محیط بیرون منتشر شده و در نتیجه سنتز DNA، RNA و پروتئین‌ها متوقف شود (۱۰،۱۱). یک مدل که فعالیت بیشتر پپتیدهای ضد میکروب را نشان می‌دهد مدل Shai-Matsuzaki-Huang (SMH) است. این مدل واکنش پپتید با غشا، به همراه جا به جایی لپیدها، تغییر در ساختار غشا، و در نمونه‌های خاص ورود پپتید به درون سلول هدف را پیشنهاد می‌کند (۱۲) و به طور کلی عمل پپتیدهای ضد میکروب با مکانیسم SMH در غلظت میکرو مولار، میکروب‌ها را می‌کشد.

دیفنسین‌ها، پپتیدهای کاتیونیک کوچک (۴۵-۱۸) آمینواسید، با وزن مولکولی ۶-۲۰ کیلو دالتون و غنی از اسید آمینه‌ی آرژنین با الگوی حفاظت شده‌ای از اتصال دی‌سولفیدی از جمله ۶ تا ۸ ریشه سیستمین می‌باشند. در مطالعات قبلی ۱۳ پپتید کاتیونیک از گرانول‌های سیتوپلاسمی نوتروفیل‌های خون گاو گزارش شده است. این ۱۳ پپتید بسیار کاتیونیک می‌باشند و دارای توالی‌های حفاظت شده‌ای با پپتیدهای ضد میکروبی تولید شده از سلول‌های اپی‌تلیال هستند. همچنین در سال ۱۹۹۸ بتا دیفنسین (EBD) از سلول‌های اپی‌تلیال درونی گاو جداسازی شده است (۱۳،۱۴). بتا دیفنسین‌های گاو اثرات میکروب‌کشی قوی در *in vitro* اعمال می‌کنند

تلقیح کشت شبانه به محیط کشت بیانی به نسبت ۱ به ۱۰ صورت گرفت. پس از رسیدن جذب نوری (OD) به ۰/۸ در طول موج ۶۰۰ نانومتر القاء بیان ژن به وسیله‌ی Isopropyl-β-D-thio-galactoside (IPTG) با غلظت نهایی ۱ میلی مولار صورت گرفت (۲۲،۲۳).

بهینه سازی و تولید پروتئین نو ترکیب در وکتور pET-32a(+) برای سه کمیت دانسیته‌ی سلولی در زمان القاء (جذب نوری ۰/۷ تا ۱ در طول موج ۶۰۰ نانومتر)، مدت زمان القاء (۱، ۲، ۳، ۴ و ۶ ساعت و نیز یک شبانه روز بعد از القاء) و دمای رشد (۲۶، ۲۸، ۳۰ و ۳۷ درجه سانتی‌گراد) ارزیابی گردید. سپس نمونه‌ها در ۵۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ دقیقه سانتریفیوژ شد و رسوب سلولی بعد از حل شدن در بافر Tris-EDTA (TE) و تأثیر امواج ماوراء صوت (قدرت ۸۰٪ و پالسی ۰/۵) در دور ۱۳۰۰۰ دور به مدت ۲۰ دقیقه سانتریفیوژ شد. مایع فاز رویی جهت بررسی بیان بر روی ژل ۱۲ درصد SDS-PAGE الکتروفورز شد. با توجه به نتایج به دست آمده بهترین دما و مدت زمان بعد از القاء مشخص گردید. تعیین غلظت پروتئین نو ترکیب به کمک روش برادفورد انجام شد. در این راستا بعد از تهیه آلبومین سرم گاوی (BSA) از شرکت سینا ژن بر اساس میزان جذب (OD) نمودار استاندارد در طول موج ۵۹۵ نانومتر رسم گردید و در مرحله‌ی بعد با استفاده از آن غلظت پروتئین نو ترکیب تخمین زده شد (۲۴). به منظور انجام وسترن بلات ابتدا مقدار مساوی از پروتئین قبل از القا و بعد از القا با تکرار روی ژل SDS-PAGE ۱۲ درصد برده شد به طوری که با نصف کردن ژل SDS-PAGE نیمی از ژل جهت رنگ آمیزی با کوماسی بلو و نیمه دیگر جهت انجام وسترن بلات و مقایسه با الگوی پروتئینی ژل پلی اکریل امید به کار گرفته شد. پروتئین‌ها از ژل پلی اکریل امید توسط بافر انتقال (تریس ۲۵ میلی مولار/ گلیسین ۱۹۲ میلی مولار همراه با متانول ۲۰٪) به مدت یک شبانه روز با شدت ۸۰ میلی آمپر به غشای پلی وینیلیدین دی فلوراید Polyvinylidene Difluoride (PVDF) منتقل شدند.

مرحله مسدود سازی با قرار دادن کاغذ در skim milk ۵ درصد به مدت دو ساعت صورت گرفت. سپس آنتی بادی mouse anti-(His)6 peroxidase با رقت ۱ به ۲۰۰۰ اضافه گردید. پس از شست و شوی کاغذ PVDF با بافر شست و شو (Tris ۰/۰۲ مولار، NaCl نیم مولار و HCL ۶ نرمال) ۳ مرتبه و هر بار به مدت ۵ دقیقه سوسترای تترامتیل بنزدین Tetramethylbenzidine (TMB) اضافه گردید. با ظاهر شدن باند قهوه ای پروتئین مورد نظر شناسایی گردید. به منظور رهایی پروتئین BNBD2 از پروتئین نو ترکیب، (پروتئین نو ترکیب دارای جایگاه شکافت آسپارتیک-پرولین برای فرمیک اسید می باشد) در محلول ۵۰ درصد فرمیک اسید (۲۶ میلی لیتر فرمیک اسید ۸۰٪ و ۲۰ میلی لیتر پروتئین نو ترکیب) و دمای ۵۰°C به مدت ۲۴ ساعت شکافت یافت. بعد از شکافت، مخلوط واکنش به مدت ۲ ساعت لیوفیلیزه شد تا فرمیک اسید از محلول حاوی پروتئین حذف شود.


برای تخلیص و تغلیظ پروتئین BNBD2، از سانتریفون با غشای سلولزی (Vivaspin2 از شرکت Sartorius آلمان) استفاده شد. پس از اضافه نمودن حداکثر ۲ میلی لیتر محلول حاوی پروتئین BNBD2، سانتریفون به مدت ۴۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه و ۴۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید. محلول عبور کرده از غشا سلولزی، حاوی پروتئین تخلیص شده BNBD2 بود که جهت بررسی خاصیت ضد میکروبی استفاده شد.

به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین تخلیص شده، در محیط کشت (Tryptone Soya Broth (TSB)، کشت شبانه از باکتری‌های *Escherichia coli*، *Staphylococcus aureus*، *Klebsiella pneumoniae* و *Pseudomonas aeruginosa* تهیه گردید. بعد از یک شبانه روز پس از ایجاد چاهک بر روی پلیت‌های حاوی محیط کشت مولر هیتون آگار، به میزان ۸۰ میکرولیتر از نمونه پروتئینی تخلیص شده در زمان‌های مختلف بعد از القاء به عنوان کنترل مثبت و ۸۰ میکرولیتر از نمونه‌ی فیورژن پروتئین به عنوان کنترل منفی استفاده گردید و در

دمای ۳۷ درجه یک شبانه روز برای بررسی خاصیت میکروب کشتی این پپتید، انکوبه شد.

یافته‌ها:

در این مطالعه، بیشترین غلظت پروتئین بیانی در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد مشاهده شد. بررسی بیان پروتئین، وجود یک باند پروتئینی با اندازه‌ی حدود ۲۵ کیلو دالتون، معادل با وزن مولکولی پروتئین نو ترکیب BNBD2 در الگوی پروتئین‌های باکتریایی القاء شده نشان داد؛ در حالی که باند پروتئینی مذکور در الگوی پروتئینی سلول‌های باکتریایی القاء نشده وجود نداشت و مشخص شد که بیشترین بیان در مدت زمان ۴ ساعت بعد از القاء بوده است (تصویر شماره ۱) و نتایج حاصل از انجام SDS-PAGE با روش وسترن بلاتینگ تایید شد به طوری که در ستون مربوط به نمونه قبل از القاء




تصویر شماره ۲: آنالیز وسترن بلاتینگ

۱: مارکر پروتئینی، ۲: سلول لیز شده‌ی *E. coli BL21(DE3)*
 ۳: سلول لیز شده *E. coli BL21(DE3)* ترانسفورم شده با وکتور نو ترکیب قبل از القاء با IPTG ۶-۴: سلول لیز شده *E. coli BL21(DE3)* ترانسفورم شده با وکتور نو ترکیب بعد از القاء با IPTG در زمان‌های مختلف ۲، ۳ و ۴ ساعت بعد از القاء؛ علامت پیکان نشان دهنده پروتئین نو ترکیب قبل از القاء.


هیچ بانده‌ی مشاهده نمی‌شود ولی در سایر ستون‌ها بیان پروتئین نو ترکیب با وزن مذکور مشاهده گردید (تصویر شماره ۲).

با استفاده از روش برادفورد غلظت پروتئین نو ترکیب برابر ۱۹/۲۹۵۴ میکروگرم در ۱۰ میلی لیتر از محیط کشت تعیین گردید. با اضافه نمودن فرمیک اسید ۵۰ درصد به محلول حاوی پروتئین نو ترکیب و نگهداری آن در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت یک شبانه روز، شکافت در جایگاه آسپارتیک-پرولین مربوط به فرمیک اسید انجام و پس از لیپوفیلیزه کردن محلول به مدت ۲ ساعت به منظور حذف اثر فرمیک اسید در بررسی خاصیت ضد باکتری و عبور محلول پروتئین از ساتریکون، اندازه باند پروتئین تخلیص شده به روی ژل تریسین ۱۶ درصد مطابق با اندازه پیش بینی شده (معادل با ۴۰ اسید آمینه) حدود ۴/۶ کیلودالتون تعیین گردید (تصویر شماره ۳).



تصویر شماره ۱: تصویر ژل SDS-PAGE، بیان پروتئین نو ترکیب بتا دیفنسین ۲ نوتروفیل های گاو (BNBD2) در دمای ۳۰ درجه و غلظت یک میلی مولار IPTG

۱: مارکر پروتئینی، ۲: سلول لیز شده *E. coli BL21(DE3)*
 ۳: سلول لیز شده *E. coli BL21(DE3)* ترانسفورم شده با وکتور نو ترکیب قبل از القاء، ۶-۴: بیان پروتئین نو ترکیب به ترتیب ۲، ۳ و ۴ ساعت بعد از القاء با IPTG علامت پیکان نشان دهنده پروتئین نو ترکیب قبل از القاء.



بحث:


از آن جایی که مقدار کم دیفنسین‌های طبیعی در حیوانات وجود دارد و ارزش استخراج بالا است و صنعتی کردن و کاربرد دیفنسین‌های طبیعی در مهار و کنترل بیماری‌ها در حیوانات اهلی و مایان محدود است کلونینگ دیفنسین‌ها با استفاده از تکنیک‌های بیولوژی مولکولی و توسعه حیوانات ترانس ژنیک وسیله اصلی برای به دست آوردن دیفنسین‌ها می‌باشد. فعالیت بالای پپتیدهای ضد میکروبی در *in vitro* این هدف را در بر دارد که این پپتیدها ممکن است در آینده‌ی نزدیک در معالجه عفونت‌های باکتریایی در *in vivo* موثر باشند.

هر پروتئین با توجه به مقدار بیان و ساختار و توالی آن شرایط بیانی خاص خود را دارا می‌باشد در نتیجه برای دستیابی به شرایط بهینه‌ی بیان پروتئین نو ترکیب، نیاز به بهینه‌سازی شرایط است. به منظور بهینه‌سازی بیان پروتئین نو ترکیب BNBD2 چندین پارامتر از مجموعه پارامترهای موثر در میزان بیان پروتئین نو ترکیب تغییر داده شد. فاکتورهایی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل دانسیته‌ی سلولی در زمان القاء، مدت زمان القاء و دمای رشد بود. نتایج نشان داد که بهترین بیان هنگام استفاده از محیط کشت LB و جذب نوری ۰/۸ در طول موج ۶۰۰ نانومتر اتفاق افتاده است. در باره‌ی مدت زمان القاء و دمای رشد مشاهده گردید که هنگامی که محیط کشت القاء شده در دمای ۳۰ درجه انکوبه می‌شد؛ بعد از القاء میزان بیان پروتئین نو ترکیب بالا بود. در تحقیقی مشابه، جهت کلونینگ بیان و تخلیص LL-37 (پروتئینی مشابه دیفنسین‌ها با خاصیت ضد میکروبی)، از وکتور pET-32a(+) استفاده شد. در آن تحقیق پروتئین LL-37 به وسیله‌ی فیوژن شدن با تیرو دوکسین و His tag و دارا بودن جایگاه شکافت آسپارتیک-پرولین، بعد از شکافت جایگاه با فرمیک اسید تحت کروماتوگرافی تمایلی کبالت قرار گرفت و تخلیص پپتید با تکنیک HPLC صورت پذیرفت. برای

تصویر شماره ۳: ژل تریسین ۱۶ درصد برای تعیین حضور

پروتئین نو ترکیب بتا دیفنسین ۲ نوتروفیل‌های گاو (BNBD2)
 ۱. کنترل مثبت پروتئین‌هایی با وزن‌های مشخص ۲۵ و ۵ کیلو دالتون، ۲. پروتئین برش یافته شده با وزن مولکولی ۴/۶ کیلو دالتون پس از عبور از سائتریکول؛ علامت پیکان نشان دهنده پروتئین نو ترکیب قبل از القاء.

با بررسی هاله‌ی عدم رشد در محیط کشت مولر هینتون آگار، اثر میکروب کشی این پروتئین تخلیص شده بر رشد باکتری‌های *Escherichia coli*، *Klebsiella pneumonia*، *Staphylococcus aureus* و *Pseudomonas aeruginosa* تأیید گردید (تصویر شماره ۴).



تصویر شماره ۴: بررسی فعالیت ضد باکتری پروتئین

نو ترکیب بتا دیفنسین ۲ نوتروفیل‌های گاو (BNBD2) با روش agar gel diffusion

الف: *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC27853)، ب: *Escherichia coli* (ATCC35218)، ج: *Klebsiella pneumonia* (ATCC700603)، د: *Staphylococcus aureus* (25922).
 در هر پلیت کنترل منفی: فیوژن پروتئین قبل از در معرض قرار گرفتن با فرمیک اسید، ۱-۳ به ترتیب پروتئین BNBD2 تخلیص شده ۲۴ و ۴۲ ساعت بعد از القاء).

طراحی یک سیستم بیان ژن و تهیه پروتئین نوترکیب در نظر داشت مرحله‌ی خالص سازی پروتئین می‌باشد. با توجه به این که هر مرحله‌ی خالص سازی هزینه‌های خاص خود را دارا می‌باشد بنابراین هر چه مراحل خالص سازی کمتر باشد به همان اندازه روش تخلیص مناسب‌تر است (۲۹،۲۸).

نتیجه گیری:

پپتیدهای ضد میکروب، دارای مکانیسم‌های ضد میکروبی ویژه ای هستند که فشار انتخابی در طی سال‌های تکامل را تحمل کرده و یک پایگاه برای توسعه‌ی آنتی‌بیوتیک‌های جدید می‌باشند. هر پروتئین شرایط بیان مخصوص به خود را دارا می‌باشد که شرایط دمایی، غلظت IPTG و طول زمان القاء سولول‌ها در مقدار تولید پروتئین موثر است. براساس نتایج این مطالعه دمای رشد ۳۰ درجه، مدت زمان ۴ ساعت و غلظت ۱ میلی مولار ماده القاء کننده در محیط LB بیشترین میزان بیان پروتئین BNBD2 را نشان داد که می‌توان برای تولید انبوه و صنعتی پروتئین مورد استفاده قرار داد.

تشکر و قدردانی:

این پژوهش تحت حمایت مالی دانشگاه شهرکرد در قالب طرح پژوهشی با شماره ۱۴۰/۸۹ مورخ ۹۱/۲/۲۷ و با راهنمایی‌های اساتید محترم از دانشگاه‌های شهرکرد و اصفهان انجام گردیده است؛ لذا از آن مدیریت محترم و اساتید بزرگوار تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

تولید پپتیدهای ضد میکروبی در *E. coli* و حفاظت از تأثیرات کشنده این پپتیدها برای میزبان و نیز حفاظت آنها از تخریب پروتولیتیک، پپتیدها را به یک حامل پروتئینی متصل می‌کنند و پپتید هدف در مرحله بعدی توسط برش آنزیمی یا شیمیایی جدا می‌شود. این پروتئین‌های حامل پپتید را از پروتئین‌های سلولی و میزبان را از پپتید توکسیک حفظ می‌کند. از پروتئین‌های حامل مانند گلوکاتیون ترانسفراز و تیوردوکسین برای اتصال به پپتیدهای آنتی باکتریال به وفور استفاده شده است که از بین این دو تیوردوکسین به دلیل اندازه کوچک (۱۱ کیلو دالتون) و افزایش حلالیت پروتئین نوترکیب در *E. coli*، بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند (۲۵). علاوه بر این دیفنسین‌ها در ساختمان خود دارای اسید آمینه سیستمین بوده و باند دی سولفیدی تشکیل می‌دهند ولی عدم تشکیل آنها در عملکردشان یعنی تخریب غشا نقشی ندارد و آنچه در فعالیت ضد میکروبی دیفنسین‌ها نقش دارد بار و هیدرو فوبیسیته آنها می‌باشد (۲۶،۲۷). بنابراین امکان بیان این پروتئین در فضای سیتوپلاسمی باکتری *E. coli* ممکن می‌شود.

در این مطالعه از وکتور pET32a، دارای توالی کد کننده پروتئین تیوردوکسین جهت جلوگیری از اثر باکتری کشی پروتئین دیفنسین استفاده گردید. پس از بیان پروتئین نوترکیب BNBD2 به صورت سیتوپلاسمی با برش در جایگاه شکافت آسپارتیک-پرولین پروتئین مورد نظر از توالی‌های اضافه مانند تیوردوکسین و هگزاهیسیتیدین جدا شده استفاده و با عبور از سانتریفون خالص گردید. یکی از جنبه‌های مهم که باید هنگام

منابع:

1. Bowie AG, Haga IR. The role of Toll-like receptors in the host response to viruses. Mol Immunol. 2005 May; 42(8): 859-67.
2. Ganz T, Selsted ME, Lehrer RI. Defensins. Eur J Haemato. 1990 Jan; 44(1): 1-8.
3. Brogden KA, Ackermann M, McCray PB Jr, Tack BF. Antimicrobial peptides in animals and their role in host defences. Int J Antimicrob Agents. 2003; 22(5): 465-78.

4. Lazarev VN, Govorun VM. Antimicrobial peptides and their use in medicin. Appl Biochem and Microbiol. 2012; 46(9): 803-14.
5. Hancock RE, Sahl HG. Antimicrobial and host-defense peptides as new anti-infective therapeutic strategies. Nat Biotechnol. 2006 Dec; 24(12): 1551-7.
6. Mookherjee N, Hancock RE. Cationic host defence peptides: innate immune regulatory peptides as a novel approach for treating infections. Cell Mol Life Sci. 2007 Apr; 64(7-8): 922-33.
7. Schutte BC, McCray PB, Jr. [beta]-defensins in lung host defense. Annu Rev of Physiol. 2002; 64: 709-48.
8. Sorensen OE, Follin P, Johnsen AH, Calafat J, Tjabringa GS, Hiemstra PS, et al. Human cathelicidin, hCAP-18, is processed to the antimicrobial peptide LL-37 by extracellular cleavage with proteinase 3. Blood. 2001; 97(12): 3951-9.
9. Ganz T, Selsted ME, Szklarek D, Harwig SS, Daher K, Bainton DF, et al. Defensins. Natural peptide antibiotics of human neutrophils. J Clin Invest. 1985; 76(4): 1427-35.
10. Matsuzaki K. Why and how is peptide-lipid interactions utilized for self-defense? Magainins and tachyplesins as archetypes. Biochim Biophys Acta. 1999; 1462(1-2): 1-10.
11. Yang L, Weiss TM, Lehrer RI, Huang HW. Crystallization of antimicrobial pores in membranes: magainin and protegrin. Biophys J. 2000; 79(4): 2002-9.
12. Shai Y. Mechanism of the binding, insertion and destabilization of phospholipid bilayer membranes by alpha-helical antimicrobial and cell non-selective membrane-lytic peptides. Biochim Biophys Acta. 1999; 1462(1-2): 55-70.
13. Tarver AP, Clark DP, Diamond G, Russell JP, Erdjument-Bromage H, Tempst P, et al. Enteric beta-defensin: molecular cloning and characterization of a gene with inducible intestinal epithelial cell expression associated with *Cryptosporidium parvum* infection. Infect Immun. 1998; 66(3): 1045-56.
14. Cormican P, Meade KG, Cahalane S, Narciandi F, Chapwanya A, Lloyd AT, et al. Evolution, expression and effectiveness in a cluster of novel bovine beta-defensins. Immunogenetics. 2008; 60(3-4): 147-56.
15. Zhao P, Bai R, Chen L, Hu W, Wen S, mi Y, et al. Prokaryotic expression of antimicrobial bovine β -defensin-1 in *Escherichia coli*. Afr J Biotechnol. 2011; 10(50): 10212-17.
16. Wu J, Wang C, He H, Hu G, Yang H, Gao Y, et al. Molecular analysis and recombinant expression of bovine neutrophil beta-defensin 12 and its antimicrobial activity. Mol Biol Rep. 2011; 38(1): 429-36.
17. Campanelli D, Detmers PA, Nathan CF, Gabay JE. Azurocidin and a homologous serine protease from neutrophils. Differential antimicrobial and proteolytic properties. J Clin Invest. 1990; 85(3): 904-15.
18. Li Y, Chen Z. RAPD: a database of recombinantly-produced antimicrobial peptides. FEMS Microbiol Lett. 2008; 289(2): 126-9.
19. Figueredo S, Mastroianni JR, Tai KP, Ouellette AJ. Expression and purification of recombinant alpha-defensins and alpha-defensin precursors in *Escherichia coli*. Methods Mol Biol. 2010; 618: 47-60.
20. Gordon YJ, Romanowski EG, McDermott AM. A review of antimicrobial peptides and their therapeutic potential as anti-infective drugs. Curr Eye Res. 2005; 30(7): 505-15.
21. Karimi N. Cloning and expression of BNBD2 in *Escherichia coli*. [Dissertation]: Univ Shahrekord; 2012.

22. Hajikhani B, Najar Peerayeh SH, Soleimanjahi H, Zuhair H. Cloning, expression, purification and antigenicity of recombinant UreB332-HpaA fusion protein from *Helicobacter pylori* Modares J Med Sci Pathol. 2010; 13(2): 1-10.
23. Ebrahimipour Gh, Bambai B, Khodabande M, Torkynejad F. Cloning and expression of Penicillin acylase from *Arthrobacter viscosus* in *E. coli*. Iran Biology. 2009 spring; 22(1): 1-11.
24. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem. 1976; 72: 248-54.
25. Li Y. Recombinant production of antimicrobial peptides in *Escherichia coli*: a review. Protein Expr Purif. 2011; 80(2): 260-7.
26. Suresh A, Verma C. Modelling study of dimerization in mammalian defensins. BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 5): 17.
27. Sahl HG, Pag U, Bonness S, Wagner S, Antcheva N, Tossi A. Mammalian defensins: structures and mechanism of antibiotic activity. J Leukoc Biol. 2005; 77(4): 466-75.
28. Clark ED. Protein refolding for industrial processes. Curr Opin Biotechnol. 2001; 12(2): 202-7.
29. Rastgar Jazii F, Karkhane AA, Yakhchali B, Fatemi SS, Deezagi A. A simplified purification procedure for recombinant human granulocyte macrophage-colony stimulating factor from periplasmic space of *Escherichia coli*. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2007; 856(1-2): 214-21.

Archive of SID

Optimization of expression, purification and handling anti bacteria feature protein of bovine neutrophil B-defensing BNBD2

Karimi N (MSc)¹, Saffar B (PhD)^{*1,2}, Ghaedi K (PhD)³, Mobini-Dehkordi M (PhD)¹
¹Genetic Dept., Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran; ²Biotechnology Research Dept., Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran; ³Biology Dept., Isfahan University, Isfahan, I.R. Iran.
Received: 6/ Oct/2012 Revised: 3/ Dec/2012 Accepted: 20/ Dec/2012

Background and aims: Defensins are one of the largest families of antimicrobial peptides and, because of their activity against bacteria, fungi, and many coated and uncoated viruses, are very profitable as new antibiotics. This study was done to evaluate the optimization of expression, purification and handling antibacterial features of BNBD2 protein.

Methods: In this experimental laboratory study, *E. coli* BNBD2 (DE3) carrying pET-32a(+) vector in which BNBD2 was homogenized was used. BNBD2 expression was evaluated through changes in cell density, growth temperature, the duration of induction using vertical electrophoresis (SDS-PAGE) and Bradford test both qualitatively and quantitatively. The purification of recombinant protein was done by chemical method of fission in the position of formic acid and passing Centricon, and anti-bacterial effect of the purified protein on some gram negative and gram positive bacteria was examined

Results: By induction start in optical absorption of 0.8 in wave length of 600 nm and inducing IPTG in concentration of 1 milimolar, growth temperature of 30⁰C, and duration of 4h after induction, the highest expression was obtained in Luria-Bertani culture medium. The recombinant protein was purified by fission in formic acid and passing centricon. Western blot test results indicated that the recombinant protein was specifically connected to mouse anti-(His) 6 peroxidase antibody. The formation of inhibition zone in culture media of Hinton agar containing culture swab of the studied bacteria indicated this protein's antibacterial property.

Conclusion: BNBD2 protein has antibacterial effects and can be expressed in *E. coli* and this protein has antibacterial effects.

Keywords: Antimicrobial peptides, BNBD2, Chemical fission, Expression, Optimization, Purification.



Cite this article as: Karimi N, Saffar B, Ghaedi K, Mobini-Dehkordi M. The Optimization of expression, purification and handling anti bacteria feature protein of bovine neutrophil B-defensing BNBD2. J Shahrekord Univ Med Sci. 2013 Aug, Sep; 15(3): 89-97.

***Corresponding author:**

Genetic Dept., Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran. Tel: 00983814424419,
E-mail: saffar_b@sci.sku.ac.ir

SID



ابزارهای
پژوهش



سرویس ترجمه
تخصصی



کارگاه های
آموزشی



بلاگ
مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری
STES



فیلم های
آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



کارگاه آموزشی
آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات ISI

آموزش مهارت های کاربردی
در تدوین و چاپ مقالات ISI



کارگاه آموزشی
روش تحقیق کمی

روش تحقیق کمی



کارگاه آموزشی
آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

آموزش نرم افزار Word
برای پژوهشگران