

# SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

## کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL

پروپوزال

مركز آموزش  
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین  
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



مركز آموزش  
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

کارگاه آنلاین  
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI  
Scopus

مركز آموزش  
آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

## رابطه ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی با چاقی شکمی و عمومی

لیلا جمشیدی<sup>۱</sup>، علی اصغر سیف<sup>۲</sup>، رامین شهبانی<sup>۳</sup>

۱. مربی آموزش داخلی جراحی پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، دانشکده علوم پایه

۲. استادیار آمار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، دانشکده علوم پایه

۳. استادیار فیزیولوژی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی

تاریخ دریافت مقاله: ۹۰/۵/۶

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۰/۵/۱۰

۳۳ درصد از زنانی که تری گلیسرید بیشتر از ۱۵۰ داشتند دچار چاقی شکمی بودند تنها ۸ درصد (۳۶ نفر) زنان با وزن عادی TG غیرطبیعی داشتند. اگر چه فراوانی مقادیر هایپرتری گلیسریدی در مردان بیشتر از زنان بود لیکن تنها بین چاقی شکمی با هایپرتری گلیسریدی در زنان ارتباط معنی دار آماری به دست آمد ( $p=0/006$ ). بین اختلال قند خون ناشی از بالا با چاقی مرکزی در زنان ارتباط آماری معنی دار وجود داشت ( $p=0/012$ ). بین شاخص توده بدنی و فشارخون سیستولی ( $p=0/0001$ ) و فشارخون دیاستولی ارتباط آماری معنی دار به دست آمد ( $p=0/001$ ). بین فشار خون سیستولیک و چاقی شکمی در هر دو جنس ( $p=0/007$ ) و بین فشار خون دیاستولیک با چاقی مرکزی در زنان رابطه آماری معنی دار وجود داشت ( $p=0/02$ ).

یافته‌های پژوهش نشان دهنده شیوع بالای چاقی و ارتباط آن با برخی ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی و عروقی است پیشنهاد می‌شود در جوامعی که شیوع اختلالات چاقی بالاست در سبک زندگی افراد تغییرات اصلاحی در جهت افزایش سطح آگاهی و عملکرد بهداشتی ایجاد شود بدیهی است برای پیشگیری و ارتقاء سطح آگاهی، نیاز به همکاری همه مردم جامعه است. [م ت ع پ ز، ۱۳۹۰؛ ۱۳ (ویژنامه ۱): ۲۸]

### References

1. Parvez H, Bisher K, Meguid EN. Obesity and diabetes in the developing world: A growing challenge. *N Engl J Med* 2007; 356: 213-215.
2. Douglas P, Libby Z, Braunwald B. Text book of cardiovascular medicine. 7th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2005.
3. Doost-Mohammadian A, Keshavarz A, Dorosty A, et al. [Survey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan province girls secondary school] *Pessian. koomesh* 2005; 6(3): 187-194.

در بسیاری از کشورها بیماری‌های غیر قابل انتقال روند صعودی دارند<sup>۱</sup> و دلایل عمده آن افزایش طول عمر و طولانی‌تر شدن زمان مواجهه با عوامل خطر و تغییر الگوی زندگی است<sup>۲</sup> و در سال ۲۰۲۰ بیماری‌های قلب و عروق اولین علت مرگ در کل دنیا خواهد بود.<sup>۳</sup> این مطالعه توصیفی تحلیلی با هدف تعیین رابطه برخی ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی عروقی با چاقی در طی ۳ ماه بر روی ۱۰۲۸ نفر به‌طور تصادفی، انجام شد. پس از اندازه‌گیری دور کمر و دور باسن محاسبه و نسبت بالاتر از ۰/۸۸ در زنان و میزان بالاتر از ۱/۰۲ در مردان چاقی شکمی در نظر گرفته شد. فشارخون با دقت ۵۰ میلی‌متر جیوه اندازه‌گیری شد (پرفشاری خون  $BP \geq 130/85$  mmHg). قد با دقت ۰/۱ سانتی‌متر و از وزنه با دقت ۰/۵ کیلوگرم برای توزین نمونه‌ها با حداقل لباس استفاده شد و شاخص توده بدنی به‌صورت  $BMI > 25$  به‌عنوان اضافه وزن و  $BMI \geq 30$  چاقی در نظر گرفته شد. هایپرتریگلیسریدی ( $TG \geq 150$  mg/dl) و HDL-C سرمی پایین، دیابت به صورت قند ناشی از سرم بیشتر یا مساوی ۱۲۶ mg/dL، یا استفاده‌ی مرتب از داروهای کاهش دهنده‌ی قند خون ثبت گردید جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های Cramer's V،  $\chi^2$ ،  $t$ ،  $u$  و مینتیو استفاده گردید.

۲۱ درصد از زنان و ۱۲/۷ درصد از مردان دچار چاقی شکمی و ۴۲/۴ درصد از کل نمونه‌ها دچار اضافه وزن و ۱۶/۹ درصد دچار درجات مختلف چاقی عمومی بودند. حداکثر میانگین نسبت دور کمر به دور باسن در سن بالای ۵۰ سال بود و این اختلاف میانگین معنی‌دار می‌باشد ( $p=0/005$ ). تنها ۱۹ درصد از زنان دچار چاقی یا اضافه وزن  $HDL \geq 50$  داشتند اختلال HDL در هر دو جنس، در افرادی که اضافه وزن داشتند، بیشتر از سایر نمونه‌ها بود،  $\geq 40$  HDL در مردان دچار چاقی شکمی ۷/۹ درصد بود. یافته‌ها بین افزایش میزان HDL با چاقی مرکزی در مردان ارتباط معنی‌دار آماری نشان دادند، به طوری که با افزایش چاقی مرکزی مقادیر HDL کاهش می‌یافت ( $p=0/05$ ).

Please cite this article as: Jamshidi L, Seif A, Shabani R. The association of cardiovascular disease risk factors with generalized and abdominal obesity. *Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS)* 2012; 13(suppl 1): 28.

# SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

## کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL  
پروپوزال

پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین  
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین  
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI  
Scopus

آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو