



۲ و ۳ خرداد ۱۳۹۲

همایش کشوری سارکوئیدوز



عنوان : عوارض چشمی سارکوئیدوزیس

دکتر حسن بهبودی، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مركز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقدمه: چشم تحت تاثیر بسیاری از بیماریهای سیستمیک قرار می گیرد. یکی از بیماریهای مهم سیستمیک که چشم انسان را دچار آسیب می کند بیماری سارکوئیدوز می باشد.

بحث: بیماری سارکوئیدوز در هر سنی انسان را مبتلا می کند ولی بیشتر در سن ۲۰ تا ۵۰ سالگی دیده می شود. این بیماری عوارض مهمی بر روی ریه ها، استخوانها، چشم، پوست و مغز دارد که عوارض چشمی آن در ۵۰٪-۲۵٪ از بیماران سارکوئیدوز دیده می شود. گرفتاری پلک ها، اوربیت، غدد اشکی، ملتحمه و سگمان قدامی و خلفی در چشم دیده می شود.

از علائم مهم این بیماری در چشم، التهاب غدد اشکی، ملتحمه و متعاقب آن خشکی چشم، التهاب اتاق قدامی و ایجاد ندولهای آیریس، چسبندگی خلفی آیریس به لنز، کاتاراکت، التهاب ویتره، گرانولوم عصب بینایی، واسکولیت وریدهای شبکیه و علامت مهم **Candle wax - Dripping** در اطراف وریدها، خونریزی های سطح رتین، ادم سیستوئید ماکولا از علائم مهم سارکوئیدوز در چشم است.

نتیجه گیری: علائم التهابی سارکوئیدوز در چشم می تواند به تشخیص بیماری در بیماران کمک کند و با داروهای ضد التهابی درمان شود. در صورت عدم تشخیص و درمان می تواند منجر به کاهش شدید بینایی بیماران شود.