

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ شبکه های توجه گرافی (GAN)

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛
شبکه های توجه گرافی
(Graph Attention Networks)



آموزش استفاده از وب آو ساینس

کارگاه آنلاین آموزش استفاده از
وب آو ساینس



کارگاه آنلاین مقاله روزمره انگلیسی



۲۶۷۶ پوستر

بررسی عوامل مرتبط با حاملگی های پرخطر در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد

نویسنده (گان): نازیلا نقشین*، معصومه شفیع زاده، الهه علاف زاده، خرمن خسرویانی

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیکی: nazila_naghshin@yahoo.com

مقدمه: از اساسی ترین و بهترین راههای حفظ سلامت مادر و جنین توجه به بهداشت دوران بارداری است. همچنین مراقبت پیش از زایمان با هدف شناسایی هر چه سریع تر گروه پرخطر باعث کاهش عوارض مادری و جنینی خواهد شد. مطالعه حاضر به منظور تعیین حاملگی پرخطر و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به اتاق زایمان بیمارستان شهید صدوقی انجام شده است.

روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد ۲۶۰۰ تن از زنان باردار ایرانی و غیر ایرانی بستری شده در اتاق زایمان بیمارستان شهید صدوقی طی سال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی شامل سن مادر، بیماری زمینه ای مادر، تعداد حاملگی و سن حاملگی بود که پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که ۱۰/۶٪ نمونه ها سن بالای ۳۵ سال و ۶/۲٪ زیر سن ۱۸ سال بودند، ۱۳/۹٪ زایمان زودرس، ۳/۸٪ نمونه ها برای نوبت پنجم و بیشتر از آن حامله شده اند. ۲/۹٪ نمونه ها دچار سقط مکرر و ۲/۷٪ مبتلا به پره اکلامپسی بودند. ۲/۶٪ نمونه ها مرده زایی داشتند. ۱/۸٪ دچار اختلالات مایع آمنیوتیک، ۱/۷٪ دچار سوء مصرف مواد بودند. ۱/۵٪ حاملگی چندقلویی، ۱/۱٪ نمونه ها سزارین نوبت سوم و بالاتر بودند. ۱٪ دارای مشکلات جفت و بند ناف بودند. ۱٪ مشکل نازایی، ۰/۵٪ FGR، ۳/۰٪ آنومالی ماژور جنین و ۰/۲٪ دچار نارسایی سرویکس بودند. ۲۹٪ نمونه ها به یکی از بیماری های زمینه ای مبتلا بودند که ۹/۳٪ آن ها مربوط به دیابت بودند، ۱۸/۶٪ نوزادان این مادران کم وزن بودند با توجه به یافته های این بررسی مشخص شد که سن نامناسب باروری، زایمان زودرس و به دنبال آن تولد نوزاد کم وزن و بیماری دیابت از شایع ترین عوامل خطر زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی می باشد.

بحث و نتیجه گیری: از آنجاکه سن نامناسب باروری، زایمان زودرس و بیماری دیابت شایع ترین عوامل در رابطه با حاملگی پرخطر بودند، برنامه آموزشی در این زمینه ها به عنوان بخشی از برنامه مراقبت های پری ناتال در مراکز بهداشتی در نظر گرفته شود. افزایش کیفیت مراقبت های حین بارداری و زایمان و دسترسی به مراکز درمانی با کارکنان متخصص و آموزش دیده توصیه می گردد.

کلمات کلیدی: حاملگی پرخطر، زنان باردار، سلامت مادر

SID



سرویس های
ویژه



سرویس ترجمه
تخصصی



کارگاه های
آموزشی



بلاگ
مرکز اطلاعات علمی



عضویت در
خبرنامه



فیلم های
آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛
شبکه های توجه گرافی
(Graph Attention Networks)



کارگاه آنلاین آموزش استفاده از
وب آوساینس



کارگاه آنلاین مقاله روزمره انگلیسی