

# SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

## کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ شبکه های توجه گرافی (GAN)

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛  
شبکه های توجه گرافی  
(Graph Attention Networks)



آموزش استفاده از وب آو ساینس

کارگاه آنلاین آموزش استفاده از  
وب آو ساینس



کارگاه آنلاین مقاله روزمره انگلیسی

## بررسی مقایسه‌ای سرانجام حاملگی در مادران بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان در بیمارستان طالقانی تبریز

نویسندگان: \*فهمیه صحتی شفائی کارشناس ارشد مامائی، عضو هیئت علمی گروه مامائی دانشکده پرستاری و مامائی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز. [sehhatief@tbzmed.ac.ir](mailto:sehhatief@tbzmed.ac.ir) - -  
سمیه نقی زاده عضو هیئت علمی گروه مامائی دانشگاه آزاد تبریز  
خلاصه

**مقدمه:** زمان پذیرش و بستری کردن مادر جهت زایمان می‌تواند تأثیر مهمی در سرانجام زایمان داشته باشد و توجه به این امر مانع از ایجاد بسیاری از مشکلات برای مادر و نوزاد می‌گردد. این مطالعه به منظور بررسی مقایسه‌ای سرانجام حاملگی در مادران بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان در بیمارستان طالقانی تبریز انجام گرفت

**ها:** این مطالعه توصیفی-مقایسه‌ای در بیم طالقانی تبریز . از بین مادرانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند و در دو گروه فاز نهفته و فعال قرار گرفته بودند نمونه‌گیری بصورت تصادفی انجام شد. گروه اول، افرادی که در نهفته زایمان ( نفر) و گروه دوم زنانی که در فعال زایمان ( نفر) بستری شدند و جمعاً تعداد نمونه به نفر رسید .

نیاز برای مطالعه از طریق مشاهده سیر زایمان، مصاحبه با مادران و مطالعه مندرجات پرونده بیمار گردآوری شد. آوری اطلاعات در این پژوهش، شامل پرسشنامه‌ای پنج قسمتی که به ترتیب واحدهای مورد پژوهش فرم پارتوگراف، چک لیست ارزیابی مراحل دوم، سوم و چهارم زایمان نتایج معاینات قبل از ترخیص و معاینات ده روز اول بعد از زایمان می . برای تجزیه و تحلیل ها از نرم افزار آماری SPSS (ver.13) .

**نتایج:** % زنان بستری شده در فاز نهفته دارای دیلاتاسیون سانتی / % زنان بستری شده در فاز فعال دارای دیلاتاسیون سانتی‌متری بودند. در مورد استفاده از اکسی‌توسین جهت تحریک و تقویت زایمان با /  $P <$  و میزان استفاده از آمنیوتومی با /  $P <$  بین دو اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده شد. میزان تجویز داروهای آمپی‌سیلین، هیوسین، پیتیدین و پرومتازین در زنانی که در فاز نهفته بستری شده بودند بیشتر از زنانی بود که در فاز فعال بستری شده بودند. از بین نتایج مرحله دوم زایمان، استفاده

حین زایمان، آپگار دقیقه اول، PH شریانی بند ناف و اقدامات انجام شده بر روی نوزاد اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود . میزان هموگلوبین ( /  $P <$  ) هماتوکریت ( /  $P <$  ) قبل از ترخیص و طول مدت بستری در بخش بعد از زایمان ( /  $P =$  ) بین دو گروه اختلاف آماری معنی‌داری نشان داد. با اینکه طول مدت مرحله دوم و سوم زایمان در گروه فاز نهفته بیشتر اما اختلاف معنی‌داری بدست نیامد.

**نتیجه‌گیری:** نتایج این مطالعه نشان داد که پذیرش زنان در مرحله نهفته زایمان با افزایش طول مدت لیبر، افزایش مدت بستری شدن در بخش بعد از زایمان و افزایش عوارض و مداخلات انجام شده بر روی مادر و نوزاد همراه است. بنابراین پیشنهاد می

دوران بارداری آموزش کافی به تمام زنان باردار در مورد علائم شروع مرحله فعال زایمان داده شود و به آنها توصیه گردد در صورت مشکل، با وارد شدن در مرحله فعال زایمان در بیمارستان پذیرش شوند تا از عوارض ناشی از بستری شدن زودرس آنها جلوگیری شود.

**کلمات کلیدی:** سرانجام حاملگی، فاز نهفته زایمان و فاز فعال زایمان

Title: Comparing the Outcomes of Pregnancy in Mothers Presenting in Active and Latent Phase of Spontaneous Labor in Tabriz's Taleghani Hospital

**Fahimeh Sehatie Shafaie\***MSc

Tabriz University of medical sciences, Nursing &Midwifery faculty, Midwifery Department, [sehatief@tbzmed.ac.ir](mailto:sehatief@tbzmed.ac.ir), 09143014293 ,04114776770

**Somaieh Naghizadeh** , Azad university of Tabriz, Nursing &Midwifery faculty, Midwifery Department

**Abstract:**

**Background and Aim:** Time of hospitalization of women for delivery can have an important impact on the outcome of labor and attention to it could prevent many complications affecting mother and fetus. The aim of this study was to detect the impact of early admission of women in labor and maternal and neonatal outcomes.

**Materials and Methods:** In this descriptive and comparable study , 250women with low risk Pregnancy ;single fetus and vertex presentation, that had been admitted in their latent phase (group 1) and 250 women who had similar characteristics and had been admitted in their active phase (group 2) were assessed in Taleghani hospital. Information recording forms and check lists were used for data collection. SPSS software, t-test, chi -square and logistic regression tests were used to analyze the obtained data.  $P<0.05$  was considered as the significant level.

**Results:** The results showed that the rate of oxytocin use ,Amniotomy&Antibiotic administration were high in mothers that admitted in latent phase , but these factors were low in 2<sup>nd</sup> group and the major post partum complications were not report.Comperison of pregnancy outcomes in two groups of women ( Latent &Active phase) showed that significant difference in uterus compression before and after delivery , rate of Oxytocin use , Amniotomy, length of post partum admission , uterus contractions in labor, (p 0/05).

**Conclusion:** It is suggested that Obstetricians & Midwives when admit pregnant mothers in hospital that diagnose signs of the beginning of active labor in order to prevent Maternal & Neonatal complications which could be resulted from early admission.

**Key Words:** Pregnancy out come, Latent phase, Active phase of Delivery

# SID



سرویس های  
ویژه



سرویس ترجمه  
تخصصی



کارگاه های  
آموزشی



بلاگ  
مرکز اطلاعات علمی



عضویت در  
خبرنامه



فیلم های  
آموزشی

## کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛  
شبکه های توجه گرافی  
(Graph Attention Networks)



کارگاه آنلاین آموزش استفاده از  
وب آوساینس



کارگاه آنلاین مقاله روزمره انگلیسی