

# SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

## کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL

پروپوزال

مركز آموزش  
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین  
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



مركز آموزش  
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

کارگاه آنلاین  
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI  
Scopus

مركز آموزش  
آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو



## مقایسه فراوانی سوء مصرف ترامادول در بیماران تشنجی و بیماران غیر تشنجی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان دی ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۲

امیر مقدم احمدی<sup>۱</sup>

**مقدمه و هدف:** ترامادول یکی از رایج ترین داروهایی است که امروزه به دلیل اثرات شبه مخدر آن در جهان مورد سوء مصرف قرار می گیرد. تشنج از عوارض شناخته شده مصرف ترامادول می باشد. با توجه به این که متأسفانه امروزه در کشور ایران نیز ترامادول یکی از رایج ترین داروهایی است که مورد سوء مصرف قرار می گیرد، لذا ما بر آن شدید تا با انجام این مطالعه در رفسنجان، به بررسی مقایسه فراوانی سوء مصرف ترامادول در بیماران تشنجی و غیر تشنجی مراجعه کننده به اورژانس علی ابن ابیطالب (ع) در شهر رفسنجان پرداخته و با استفاده از نتایج آن، پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات وسیع تر و کنترل شده جهت یافتن راه حلی برای الگوی مصرف مناسب تر این دارو و کاهش عوارض ناشی از آن ارائه دهیم.

**مواد و روش ها:** این مطالعه از نوع مقطعی است و بر روی بیماران تشنجی مراجعه کننده به اورژانس به عنوان گروه (case) مورد و بیماران غیر تشنجی مراجعه کننده به اورژانس انجام شد. داده ها با روش های معاینه بالینی و مصاحبه و پرسش از بیماران مراجعه کننده به اورژانس و ثبت در پرسش نامه تهیه شده پیوست صورت گرفت. داده های بدست آمده از پرسش نامه های گروه مورد و شاهد و ثبت داده ها در برنامه آماری SPSS نسخه ۱۹ با کمک روش های آمار توصیفی و تحلیلی شامل: آزمون t مستقل و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: از ۱۴۱ نفری که وارد مطالعه شدند، میانگین سنی افراد مورد مطالعه  $16/3 \pm 12/9$  سال بود. در این مطالعه تعداد بیماران مرد ۸۲ نفر (۲/۵۸٪) و تعداد بیماران زن ۵۹ نفر (۸/۴۱٪) بوده است. میزان شیوع مصرف ترامادول در این مطالعه در کل حدود ۸/۳۶٪ درصد (۵۲ نفر از ۱۴۱ نفر) بود که از این میزان ۵/۲۰٪ با شکایت تشنج و ۲/۱۶٪ از افراد با شکایاتی غیر از تشنج به اورژانس مراجعه نموده بودند. در این بررسی ما متوجه شدیم که در رابطه با متغیرهای فاصله زمانی و مصرف هم زمان

۱. پرستار بیمارستان علی بن ابیطالب، بخش اعصاب، رفسنجان



سایر داروها رابطه مستقیم و معنی داری یافت نشد. در خصوص رابطه دوز مصرفی ترامادول و بروز تشنج و همچنین متغیر جنس در این بررسی رابطه معنی دار حاصل شد.

**بحث و نتیجه‌گیری:** با توجه به نتایج حاصله می‌توان نتیجه گرفت که ریسک بروز تشنج در مردانی که سوء مصرف ترامادول دارند، بیشتر است. همچنین ارتباط مؤثری بین دوز مصرفی ترامادول و شیوع تشنج وجود دارد.

**واژه‌های کلیدی:** تشنج، ترامادول، سوء مصرف

# SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

## کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL  
پروپوزال

پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین  
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین  
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI  
Scopus



آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

دکتره تهرانی

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو