

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری STES



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



مقاله نویسی علوم انسانی



اصول تنظیم قراردادها



آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقاله



لزوم غربالگری ابتلا به ویروس نقص ایمنی انسان در بیماران کاندید آنژیوگرافی

محمد آقاعلی^{۱*}، بهنام فلاح بافکرلیالستانی^۲، نورحیاوی^۲، سجاد رضوان^۲، فریبا پیرسرای^۲

۱. پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

۲. دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

مقدمه و هدف: ابتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) با سرعت بالایی در جهان و ایران در حال گسترش است. غربالگری قبل از اقدامات تهاجمی با هدف مراقبت بیشتر پزشک توصیه نمی‌گردد ولی غربالگری عمومی بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی در برخی گاید لاین ها توصیه شده است زیرا: تشخیص و درمان بیماران در مراحل اولیه باعث افزایش طول عمر، بهبود کیفیت زندگی و کاهش شانس انتقال می‌گردد. از طرفی هنگامی که فرد از بیماری خود اطلاع یابد با کاهش رفتارهای پرخطر شانس انتقال بیماری کمتر می‌شود. در حال حاضر در بسیاری از مراکز درمانی برای بیماران کاندید آنژیوگرافی غربالگری HIV انجام می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی لزوم غربالگری ابتلا به HIV در بیماران کاندید آنژیوگرافی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه کلیه بیمارانی که در شش ماه اول سال ۱۳۹۳ به بیمارستان شهید بهشتی قم مراجعه نمودند و کاندید آنژیوگرافی بودند، وارد مطالعه شدند. کلیه بیماران از نظر ابتلا به HIV توسط تست HIVAb به روش الیزا غربالگری شدند تا در صورت مثبت بودن تست توسط وسترن بلات تشخیص قطعی داده شود. نتیجه تست به همراه مشخصات دموگرافیک بیماران وارد چک لیست گردید و توسط نرم افزار SPSS آنالیز شد. یافته ها: در مجموع ۱۳۰۲ بیمار وارد مطالعه شدند که از این بین ۵۷۰ نفر (۴۳/۸٪) زن و ۷۳۲ نفر (۵۶/۲٪) مرد بودند. میانگین سنی بیماران $59/41 \pm 11/88$ سال بود. کمترین سن ۳۰ سال و بیشترین سن ۹۰ سال بود. تست HIVAb در هیچ یک از بیماران مثبت نبود. نتیجه گیری: مطالعات نشان دادند در مواردی انجام تست به صورت روتین از نظر اقتصادی به صرفه است که شیوع HIV بیشتر از ۰/۲ درصد باشد و اغلب مطالعات غربالگری را در بیماران بین ۱۳ تا ۶۴ سال پیشنهاد می‌کنند؛ با توجه به اینکه اغلب بیماران کاندید آنژیوگرافی در سنین بالا هستند و مطالعه حاضر نیز نشان دهنده شیوع پایین HIV در بیماران کاندید آنژیوگرافی در این مرکز بود، لذا پیشنهاد می‌شود در این مرکز انجام غربالگری این بیماران مورد بازبینی قرار گیرد و در دیگر مراکز نیز بر اساس میزان شیوع HIV تصمیم گیری شود. کلمات کلیدی: ایدز، غربالگری، قم، آنژیوگرافی

همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



سامانه ویراستاری STES



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



مقاله نویسی علوم انسانی



اصول تنظیم قراردادها



آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقاله