



آیا عفونت پس از عمل جراحی شکستگی هیپ در زنان بیشتر است؟

محمد میرزایی خواه^{۱*}، احمد شیخی^۱، محمد فروزش فرد^۲، نعیم السادات کیا^۳

۱ دانشجوی هوشبری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان

۲ متخصص بیپوشی و مراقبت های ویژه، عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان

۳ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین عوارض پس از جراحی شکستگی هیپ، عفونت است. این عارضه موجب افزایش هزینه های درمانی، موربیدیتی و حتی مورتالیتی این بیماران شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین جنسیت و عفونت پس از جراحی شکستگی هیپ بوده است. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی گذشته نگر، بیماران بالای ۶۵ سالی را که جهت جراحی شکستگی هیپ طی ۵ سال اخیر در بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان بستری شده بودند، جهت مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست محقق ساخت شامل اطلاعات دموگرافیک و بروز عفونت پس از عمل جراحی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS16 صورت گرفت. یافته ها: ۲۵۹ بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که ۱۳۹ نفر زن (۵۳/۷٪) و بقیه مرد بودند. میانگین سنی بیماران $77 \pm 7/72$ (۶۵-۹۵ سال) بود. ۱۴ نفر (۵/۴٪) از بیماران مبتلا به عفونت شدند که ۱۲ نفر (۸/۶٪) از آنان زن و ۲ نفر (۱/۷٪) مرد بودند. بین جنسیت و عفونت پس از عمل جراحی ارتباط معناداری مشاهده شد ($p=0/013$).

نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، شیوع عفونت پس از عمل جراحی شکستگی هیپ در بین زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان است. بدیهی است تدابیر ویژه ای جهت جلوگیری از عفونت در زنان ضرورت می یابد.

کلمات کلیدی: عفونت، زنان، عمل جراحی

همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

Surf and download all data from SID.ir: www.SID.ir

Translate via STRS.ir: www.STRS.ir

Follow our scientific posts via our Blog: www.sid.ir/blog

Use our educational service (Courses, Workshops, Videos and etc.) via Workshop: www.sid.ir/workshop